

# Fervex D, granulat bez cukru do sporządzania roztworu, 8 saszetek



Cena: 17,38 zł

## Opis słownikowy

Marka	Fervex
Postać	saszetki
Producent	Upsa Sas
Rejestracja	Lek bez recepty

## Opis produktu

## Opis Fervex D, granulat bez cukru do sporządzania roztworu, 8 saszetek

### Opis

Preparat stosowany doraźnie w leczeniu objawowym przeziębienia i grypy. Zawiera witaminę C.

### Skład

#### (1 saszетка):

Paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg.

substancje pomocnicze: bezwodny kwas cytrynowy, poliwidon, magnezu cytrynian bezwodny, aspartam, naturalny aromat antylijski

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny.

W przypadku upośledzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej ośmiogodzinne przerwy między dawkami.

Zawartość saszетки należy rozpuścić w szklance ciepłej lub chłodnej wody.

Nie stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem.

Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

## Działanie

Działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu.

## Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

## Przeciwwskazania

Nie stosować leku Fervex D jeśli występuje:

- nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu
- u dzieci poniżej 15 lat
- u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby
- w połączeniu z innymi lekami o działaniu uspokajającym
- rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu
- fenyloketonuria, ze względu na zawartość aspartamu
- jaskra z wąskim kątem

## Działania niepożądane

- Działania neurovegetatywne: Uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowej fazie leczenia, objawy antycholinergiczne, takie jak suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu, nadciśnienie ortostatyczne, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, częściej u osób w wieku podeszłym; zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, omamy,
- Reakcje nadwrażliwości: rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk, wstrząs anafilaktyczny,
- Objawy ze strony układu krwiotwórczego: leukocytopenia, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

### Ciąża i karmienie piersią:

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.