

# Fervex ExtraTabs, 500 mg + 4 mg tabletki powlekane, 16 szt

Cena: 22,59 zł



## Opis słownikowy

Marka	Fervex
Postać	tabletki
Producent	Upisa Sas
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Paracetamol

## Opis produktu

### Skład Fervex ExtraTabs, 500 mg + 4 mg tabletki powlekane, 16 szt

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol i chlorofenaminy maleinian. Każda tabletki powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 4 mg chlorofenaminy maleinianu. Pozostałe składniki to: kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, celuloza mikrokryształiczna, powidon K 90, glicerolu dibehenian, magnezu stearynian, substancja powlekająca\*, substancja polerująca

\* hypromeloza (E 464), glikol propylenowy (E 1520), tytanu dwutlenek (E 171), azorubina, lak glinowy (E 122), indygotyna, lak glinowy (E 132) woda oczyszczona, wosk pszczele (E 901), wosk carnauba (E 903), polisorbant 20 (E 432), kwas sorbinowy (E 200).

### Działanie Fervex ExtraTabs, 500 mg + 4 mg tabletki powlekane, 16 szt

Fervex ExtraTabs zawiera 2 substancje czynne, gdzie każda z nich wywiera następujące działanie:

paracetamol - zmniejsza gorączkę i ból, działa przeciwgorączkowo,

chlorofenamina - zmniejsza katar (nieżyt błony śluzowej nosa), łzawienie oczu i kichanie.

### Wskazania Fervex ExtraTabs, 500 mg + 4 mg tabletki powlekane, 16 szt

Produkt leczniczy Fervex ExtraTabs wskazany jest do leczenia objawowego dolegliwości grypy i przeziębienia u osób w wieku 15 lat i starszych.

Lek ten łagodzi objawy związane ze stanem grypopodobnym, zapaleniem błony śluzowej nosa i gardła.

## Dawkowanie Fervex ExtraTabs, 500 mg + 4 mg tabletki powlekane, 16 szt

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki Fervex stosuje się doustnie.

Lek ten może być stosowany przez młodzież (od 15 roku życia i masie ciała powyżej 50 kg) oraz osoby dorosłe.

Fervex tabletki zawierają paracetamol i chlorofenaminę - nie należy łączyć tego leku z innymi produktami leczniczymi zawierającymi wymienione substancje czynne.

Nie należy stosować tego leku samodzielnie dłużej niż 3 - 5 dni.

Specjalne grupy pacjentów jak osoby z niewydolnością nerek powinny mieć indywidualnie ustalone dawki względem klirensu kreatyniny (określa on czynność nerek).

Młodzież powyżej 15 lat, osoby dorosłe: 1 tabletkę, nie częściej niż co 4 godziny. Nie należy przekraczać 4 tabletek na dobę (2000 mg paracetamolu i 16 mg chlorofenaminy).

## Przeciwwskazania Fervex ExtraTabs, 500 mg + 4 mg tabletki powlekane, 16 szt

Kiedy nie stosować leku Fervex ExtraTabs:

jeśli występuje uczulenia (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat,

jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, występują problemy z oddawaniem moczu (z powodu prostaty i innej przyczyny),

jeśli istnieje ryzyko wystąpienia jaskry.

## Informacje dodatkowe Fervex ExtraTabs, 500 mg + 4 mg tabletki powlekane, 16 szt

Lek zawiera paracetamol i chlorofenaminę - należy wziąć to pod uwagę stosując inne leki, które również mogą być źródłem tych substancji.

Jeśli podczas stosowania tego leku wystąpi ropna wydzielina z nosa, gorączka i/lub ból będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem.

Niektóre schorzenia mogą stanowić ograniczenie co do stosowania tego leku, są to m.in.: niewydolność nerek, choroba alkoholowa wątroby, anoreksja, bulimia, odwodnienie.

W składzie tego leku występuje azorubina (barwnik azowy, E 122), który może być przyczyną reakcji alergicznej.

Stosowanie tego leku w niektórych grupach pacjentów powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności - szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów ze skłonnością do zapań, zawrotów głowy, senności, czy pacjentów z zaburzeniami prostaty.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.