

Fervex, granulat w saszetkach do sporządzania roztworu, 8 szt.

Cena: 26,59 zł



Opis słownikowy

Marka	Fervex
Postać	saszetki
Producent	UpSa Sas
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis Fervex, granulat w saszetkach do sporządzania roztworu, 8 szt.

Opis

Preparat stosowany doraźnie w leczeniu objawowym chorób górnych dróg oddechowych. Zawiera witaminę C.

Skład

(1 saszetka):

Paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg.

substancje pomocnicze: sacharoza, bezwodny kwas cytrynowy, guma akacjowa, sacharyna sodowa, naturalny aromat cytrynowo-rumowy

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny.

W przypadku upośledzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej ośmiogodzinne przerwy między dawkami.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance ciepłej lub chłodnej wody.

Nie stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem.

Działanie

Działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu.

Wskazania

przeziębienie, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, alergiczny nieżyt nosa oraz objawy grypopodobne u dorosłych i dzieci powyżej 15 roku życia.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

- u dzieci poniżej 15 lat
- u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby
- w połączeniu z alkoholem
- w połączeniu z innymi lekami o działaniu uspokajającym

Działania niepożądane

- Działania neurovegetatywne: Uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowej fazie leczenia, objawy antycholinergiczne, takie jak suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu, nadciśnienie ortostatyczne, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, częściej u osób w wieku podeszłym; zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, omamy,
- Reakcje nadwrażliwości: rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk, wstrząs anafilaktyczny,
- Objawy ze strony układu krwiotwórczego: leukocytopenia, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i karmienie piersią: nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.