

## Fervex o smaku malinowym, granulat w saszetkach do sporządzania roztworu, 12 szt.



Cena: 37,69 zł

### Opis słownikowy

Marka	Fervex
Postać	saszetki
Producent	UpSa Sas
Rejestracja	Lek bez recepty

### Opis produktu

## Opis Fervex o smaku malinowym, granulat w saszetkach do sporządzania roztworu, 12 szt.

### Opis

FERVEX Leczy objawy przeziębienia i grypy.

Smak malinowy.

### Skład

#### Jedna saszетка zawiera:

Paracetamol 500 mg

Kwas askorbowy 200 mg

Maleinian feniraminy 25 mg

Substancje pomocnicze: sacharoza (11,555 g), kwas cytrynowy bezwodny, guma arabska, sacharyna sodowa, aromat malinowy.

W skład aromatu malinowego wchodzi: octan etylu, octan izoamylu, kwas octowy, alkohol benzylowy, trójacetylna, wanilina, p-hydroksybenzylacetone, maltodekstryna, modyfikowana skrobia kukurydziana E 1450, barwnik Allura Red E 129, błękit brylantowy E 133, żółcień pomarańczowa, Permastabil 505528 RI, malina 054428 A, sodu chlorek, sodu siarczan.

### Dawkowanie

**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat:** 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny.

W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8 godzinne przerwy pomiędzy dawkami.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. Nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem. W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, wieczorem, jak najszybciej od wystąpienia objawów.

W przypadku wystąpienia zakażenia bakteryjnego może być konieczne wdrożenie leczenia antybiotykami.

### Działanie

Fervex jest lekiem złożonym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przedwgorączkowo. Maleinian feniraminy zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

### Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

### Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku FERVEX, jeśli występuje.

- Nadwrażliwość (uczulenie) na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek
- Jaskra z wąskim kątem
- Rozrost gruczołu krokowego z utrudnionym oddawaniem moczu
- Wiek poniżej 15 lat.
- Nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy lub niedoborem sacharazy - izomaltazy, ze względu na zawartość sacharozy w leku.

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, FERVEX może powodować wystąpienie działań niepożądanych:

#### ZWIĄZANE Z FENIRAMINA

Mogą wystąpić objawy niepożądane o różnym nasileniu, zależne od dawki oraz niezależne od dawki;

- Działania neurowegetatywne:

- uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowym okresie leczenia.
- objawy antycholinergiczne, takie jak suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu,
- niedociśnienie ortostatyczne,
- zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, częściej u osób w wieku podeszłym,
- zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia,
- splątanie, omamy,
- rzadziej objawy o typie pobudzenia: niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność.

- Reakcje nadwrażliwości (rzadkie):

- rumień, świąd, wyprysk plamica, pokrzywka,
- obrzęk, rzadziej obrzęk Quinckego (obrzęk warg, języka czy krtani).
- wstrząs anafilaktyczny (rodzaj ogólnoustrojowej reakcji alergicznej typu natychmiastowego z zaburzeniami krążenia i oddychania).

• Objawy ze strony układu krwiotwórczego:

- leukocytopenia (zmniejszona liczba białych krwinek), neutropenia (zmniejszona liczba granulocytów),
- malopłytkowość (zmniejszona liczba płytek krwi),
- niedokrwistość hemolityczna.

**ZWIĄZANE Z PARACETAMOLEM:**

- Opisywano nieliczne przypadki reakcji nadwrażliwości, takich jak wstrząs anafilaktyczny, obrzęk Quinckego, rumień pokrzywka i wysypka skórna. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast zaprzestać podawania tego leku i leków o podobnym składzie.
- Obserwowano wyjątkowo rzadkie przypadki malopłytkowości (zmniejszona liczba płytek krwi), leukocytopenii i neutropenii.

U niektórych osób w czasie stosowania leku FERVEX mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

W przypadku chorych na cukrzycę należy uwzględnić obecność w leku cukru, którego zawartość wynosi 11,5 g w jednej saszetce.

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**Stosowanie innych leków**

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

**Ciąża i karmienie piersią**

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.  
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia.

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży**

Lek może być stosowany u dzieci powyżej 15 lat.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Podczas przyjmowania leku może wystąpić senność wpływająca na sprawność psychofizyczną osób prowadzących pojazdy mechaniczne i obsługujących urządzenia mechaniczne.