Flucontrol Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 5,5g x 8 saszetek

Cena: 26,59 zł

Opis słownikowy

Postać	proszek
Producent	Aflofarm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Chlorfeniramina, Fenylefryna, Paracetamol

Opis produktu

Informacje podstawowe Flucontrol Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 5,5g x 8 saszetek

FluControl Hot to produkt leczniczy zawierający paracetamol w dużej dawce. Lek przeciw objawom grypy i przeziębienia. FluControl Hot łagodzi ból i gorączkę, zmniejsza ilość wydzieliny z nosa, zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

Smak pomarańczowy.

Skład Flucontrol Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 5,5g x 8 saszetek

Substancjami czynnymi s? paracetamol (*Paracetamolum*), fenylefryny chlorowodorek (*Phenylephrini hydrochloridum*), chlorfeniraminy maleinian (*Chlorpheniramini maleas*).

1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny, 4 mg maleinianu chlorfeniraminy.

Substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, kwas cytrynowy bezwodny, sacharyna sodowa, sacharoza, sodu cyklaminian, aromat pomara?czowy.

Działanie Flucontrol Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 5,5g x 8 saszetek

FluControl HOT to połączenie paracetamolu - substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej, chlorfeniraminy - substancji zmniejszającej ilość wydzieliny oraz fenylefryny, której działanie polega na zmniejszaniu obrzęku błony śluzowej nosa.

Wskazania Flucontrol Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 5,5g x 8 saszetek

Lek FluControl Hot przeznaczony jest do leczenia objawowego przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem, obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

Dawkowanie Flucontrol Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 5,5g x 8 saszetek

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: doustnie, 1 saszetka nie częściej niż co 6-8 godzin (3-4 razy na dobę).

Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.
Jeśli gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, albo objawy ulegają nasileniu należy zwrócić się do lekarza o poradę.
W razie ustąpienia bólu lub gorączki należy zakończyć stosowanie leku FluControl Hot.

Przeciwwskazania Flucontrol Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 5,5g x 8 saszetek

Kiedy nie stosować leku FluControl Hot:

w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu (paracetamol, fenylefryny chlorowodorek, chlorfeniraminy maleinian) lub którykolwiek ze składników leku
niewydolność wątroby, wirusowe zapalenie wątroby
nadciśnienie tętnicze,
nadczynność tarczycy,
ciężka choroba serca lub tętnic,
tachykardia,
stosowanie inhibitorów MAO,
jaskra,
ciężka niewydolność nerek.

Informacje dodatkowe Flucontrol Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 5,5g x 8 saszetek

1 saszetka zawiera 3,994 g sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Zachować ostrożność podczas stosowania jeśli pacjent ma astmę i uczulenie na kwas acetylosalicylowy, pacjent jest uczulony na leki przeciwhistaminowe, pacjent jest wrażliwy na działanie leków uspokajających, pacjent ma choroby nerek, serca, płuc.
Nie stosować u pacjentów w podeszłym wieku bez porozumienia z lekarzem ze względu na zawartość fenylefryny i chlorfeniraminy i wystąpienia szczególnie takich objawów jak bradykardia, zmniejszenie pojemności minutowej serca. U osób starszych istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów jak: zawroty głowy, uspokojenie, splątanie, hipotencja, zatrzymanie moczu.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 30oC.