

Fluormex, (33,19 mg + 22,1 mg)/g żel, 50 g

Cena: 24,29 zł



Opis słownikowy

Postać	żel
Producent	Chema-Elektromet
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Fluor

Opis produktu

Informacje podstawowe Fluormex, (33,19 mg + 22,1 mg)/g żel, 50 g

Fluormex żel jest produktem leczniczym do kontaktowej fluoryzacji zębów. Jego składnikami czynnymi są aminofluorki i fluorek sodu. Produkt przeznaczony jest do stosowania zarówno dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 5 roku życia.

Skład Fluormex, (33,19 mg + 22,1 mg)/g żel, 50 g

Substancją czynną leku jest fluor w postaci aminofluorków i fluorku sodu.

1 g żelu zawiera 33,19 mg aminofluorków (Aminofluoridum) + 22,1 mg sodu fluorku (Natrii fluoridum). 1 g żelu zawiera 12,5 mg czynnego fluorku (12 500 ppm).

W skład pozostałych składników wchodzi: glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol polioksyetylenopolioksypropylenowy, woda oczyszczona, substancja poprawiająca smak i zapach (aromat miętowy).

Wskazania Fluormex, (33,19 mg + 22,1 mg)/g żel, 50 g

Lek Fluormex wskazany jest do stosowania w profilaktyce próchnicy, w przypadkach niedorozwoju twardych tkanek zębów, przy nadwrażliwości szyjek zębowych, w odwapnieniach szkliwa. Polecany jest także na wrażliwe powierzchnie zębów startych klamrami,

szynami, protezami częściowymi oraz aparatami ortodontycznymi oraz po korekcie zgryzu urazowego.

Dawkowanie Fluormex, (33,19 mg + 22,1 mg)/g żel, 50 g

Stosować żel 5-10 razy w ciągu roku, aplikując go co 2 tygodnie (1 szczotkowanie co 2 tygodnie, przez 10-20 kolejnych tygodni). Terapii nie należy prowadzić częściej niż raz w roku.

Szczotkowanie: na szczoteczkę do zębów nanieś około 1 cm żelu i szczotkuj zęby przez 3 minuty.

Wcieranie: –około 1 cm wyciśniętego żelu wcieraj się we wszystkie powierzchnie zębów przy pomocy wacika (w gabinecie stomatologicznym). U dzieci w wieku poniżej 9 lat z zaawansowaną próchnicą zaleca się pozostawić niewielkie ilości żelu w bruzdach na powierzchniach zgryzowych zębów. Przed rozpoczęciem fluorkowania szkliwa zębów konieczne jest dokładne usunięcie kamienia nazębnego.

Po zakończeniu zabiegu należy wypłuć ślinę. Nie płukać jamy ustnej (z wyjątkiem dzieci w wieku poniżej 9 lat).

Informacje dodatkowe Fluormex, (33,19 mg + 22,1 mg)/g żel, 50 g

Nie należy połykać żelu. Połykanie przez dłuższy czas pewnych ilości substancji zawierających związki fluoru, nawet o niskich stężeniach, może spowodować objawy przewlekłego zatrucia w postaci szkliwa plamkowego (fluoroza zębów).

Lek przechowywać w temperaturze pokojowej, tubkę należy zawsze stawiać na nakrętce.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stosować z innymi preparatami o wysokim stężeniu fluorków.

Jeśli lekarz tak zaleci, można stosować Fluormex razem z pastami do zębów o zawartości fluoru do 1500 ppm oraz z płukanką o zawartości fluoru do 250 ppm.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać pokarmów przez minimum 30 minut po zabiegu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować produktu w trakcie ciąży oraz karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci młodszych niż 5 lat.

Należy zachować szczególną ostrożność u dzieci poniżej 9 roku życia. Muszą one być nadzorowane przez dorosłych w trakcie stosowania produktu i nie mogą połykać żelu podczas szczotkowania, powinny lekko przepłukać jamę ustną po zabiegu.