

Foxill, 1 mg/g żel, 50 g

Cena: 19,75 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------|
| Postać | żel |
| Producent | Polpharma |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Dimetinden |

Opis produktu

Informacje podstawowe Foxill, 1 mg/g żel, 50 g

Foxill to lek działający łagodząco na zmiany skórne – zmniejsza świąd i obrzęk. Stosuje się go w przypadku ukąszeń, oparzeń (pierwszego stopnia), pokrzywce.

Skład Foxill, 1 mg/g żel, 50 g

Substancj? czynn? leku jest dimetyndenu maleinian (*Dimetinden maleas*).

1 g ?elu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu (*Dimetinden maleas*).

Substancje pomocnicze: karbomer (typ 974 P), disodu edetynian, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Działanie Foxill, 1 mg/g żel, 50 g

Foxill działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęki, łagodzi podrażnienia skóry. Wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę. Żel szybko wchłania się w głąb skóry.

Wskazania Foxill, 1 mg/g żel, 50 g

Foxill stosuje się do łagodzenia świądu towarzyszącego: chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchownym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia).

Dawkowanie Foxill, 1 mg/g żel, 50 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do stosowania na skórę.

Zazwyczaj Foxill stosuje się 2 do 4 razy na dobę. Cienką warstwę żelu należy nanieść na zmienioną chorobowo skórę.

Przeciwwskazania Foxill, 1 mg/g żel, 50 g

Nie należy stosować leku Foxill, jeśli pacjent ma uczulenie na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek składnik tego leku. oraz w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

Informacje dodatkowe Foxill, 1 mg/g żel, 50 g

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uczucie pieczenia skóry, suchość skóry, skórne reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Foxill zawiera benzalkoniowy chlorek, który jest drażniący i może powodować reakcje skórne oraz glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Należy unikać ekspozycji na słońce miejsc posmarowanych żelem Foxill.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza w przypadku zranień lub stanów zapalnych skóry.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować na brodawki sutków.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Należy unikać stosowania u małych dzieci (w wieku poniżej 2 lat) na duże obszary skóry, szczególnie w przypadkach zranień i stanów zapalnych skóry.