


Gastrotuss, syrop przeciw refluksowi, 20 ml x 20 sasz.

Cena: 53,09 zł



Opis słownikowy

Marka	Gastrotuss
Postać	syrop
Producent	Vitamed
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Gastrotuss, syrop przeciw refluksowi, 20 ml x 20 sasz.

Syrop Gastrotuss® jest wyrobem medycznym w postaci saszetek, tworzącym mechaniczną barierę antyrefluksową. Wskazany jest w leczeniu refluksu żołądkowo-przłykowego i refluksu krtaniowo-gardłowego oraz objawów takich jak: zarzucanie treści pokarmowej, zgaga (pieczenie przełyku), uczucie przeszkody w gardle, zapalenie części nosowej i krtaniowej gardła, odbijanie, wzdęcia, kaszel, dysfonia (chrypka z refleksowego podrażnienia głośni) oraz w celu łagodzenia innych zaburzeń związanych z refluksiem. Wyrób medyczny leczniczy do stosowania doustnego.

Skład Gastrotuss, syrop przeciw refluksowi, 20 ml x 20 sasz.

Alginian magnezu, symetykon, fruktoza, guma ksantanowa, miód, D-pantenol, płynne ekstrakty z *Althaea officinalis* (prawoślaz lekarski) i *Papaver Rhoëas* (mak polny), tlenek cynku, wodorowęglan sodu, wodorotlenek sodu, metylu p-hydroksybenzoesan sodowy, propylu p-hydroksybenzoesan sodowy, aromaty naturalne, erytrozyna (E127), woda oczyszczona.

Wskazania Gastrotuss, syrop przeciw refluksowi, 20 ml x 20 sasz.

Leczenie refluksu żołądkowo-przłykowego i refluksu krtaniowo-gardłowego oraz objawów takich jak:

zarzucanie treści pokarmowej,
zgaga (pieczenie przełyku),
uczucie przeszkody w gardle,

zapalenie części nosowej i krtaniowej gardła,
odbijanie,
wzdęcia,
kaszel,
dysfonia (chrypka z refluksowego podrażnienia głośni),
inne zaburzenia związane z refluksom.

Dawkowanie Gastrotuss, syrop przeciw refluksowi, 20 ml x 20 sasz.

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia:

jeśli lekarz nie zaleci inaczej, jedna saszetka (20 ml) po głównych posiłkach i przed snem,
do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania Gastrotuss, syrop przeciw refluksowi, 20 ml x 20 sasz.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Informacje dodatkowe Gastrotuss, syrop przeciw refluksowi, 20 ml x 20 sasz.

W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Nie przekraczać zalecanych dawek, przestrzegać zalecanego sposobu stosowania.

Jeśli pacjent przyjmuje inne preparaty lub leki, syrop należy stosować jako ostatni.

Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy opakowanie nie jest uszkodzone.

Preparatu nie należy używać po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności odnosi się do nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu.