

Ginkofar, 40 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Cena: 41,99 zł



Opis słownikowy

Marka	Ginkofar
Postać	tabletki
Producent	Biofarm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Miłorząb japoński

Opis produktu

Informacje podstawowe Ginkofar, 40 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Ginkofar to produkt leczniczy stosowany w celu poprawy zdolności poznawczych (osłabionej pamięci i sprawności umysłowej) u osób starszych.

Skład Ginkofar, 40 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liścia miłorzębu (Ginkgo biloba L., folium) (35-67:1).

1 tabletki powlekana zawiera 40 mg suchego wyciągu:

wyciąg natywny: 90-100%, o składzie:

- 22-27% ginkgoflawonoglikozydów,
- 5-7% laktonów terpenowych (w tym 2,8-3,4% ginkgolidów A, B i C oraz 2,6-3,2%

bilobalidu),

- nie wi?cej ni? 5 ppm kwasów ginkgolowych;
- substancja pomocnicza: glukoza ciek?a 0-10%.

Substancje pomocnicze:

Rdze? tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, talk, tlenek ?elaza ?ó?ty (E 172)

Działanie Ginkofar, 40 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Ginkofar poprawia przepływ krwi w mózgu. Dodatkowo rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek krwi. Działanie to przypisuje się zawartym w wyciągu z miłorzębu związkom:

glikozydy flawonowe,
ginkgolidy,
bilbalid.

Wskazania Ginkofar, 40 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Ginkofar stosowany jest u osób dorosłych:

w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem),
w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Przeciwwskazania Ginkofar, 40 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Kiedy nie stosować leku Ginkofar:

jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z miłorzębu lub którykolwiek ze składników leku,
jeśli pacjentka jest w ciąży.

Informacje dodatkowe Ginkofar, 40 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Osoby ze skłonnością do krwawień, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Osoby stosujące leki wpływające na krzepliwość krwi, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Przed zabiegiem operacyjnym lub stomatologicznym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Zaleca się odstawienie leku 3-4 dni przed planowanym zabiegiem.

Lek stosować ostrożnie u osób z padaczką.

Lek zawiera laktozę.