Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Gynauxil, globulki dopochwowe, 10 szt.

Cena: 15,48 zł

Opis słownikowy

Postać	globulki
Producent	Polski Lek
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Drożdże

Opis produktu

Skład Gynauxil, globulki dopochwowe, 10 szt.

glukoza, ekstrakt drożdżowy, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, siarczan manganu, podłoże tłuszczowe: trójglicerydy kwasów tłuszczowych, woda, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, etoksylowany alkohol cetostearylowy, monogliceryd kwasu rycynolowego.

Działanie Gynauxil, globulki dopochwowe, 10 szt.

Gynauxil, grobulki dopochwowe

ogranicza rozwój infekcji,
regeneruje i nawilża błonę śluzową pochwy,
zawarty w preparacie kwas hialuronowy ułatwia gojenie się ran,
kwas mlekowy działa ściągająco, a także przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwpierwotniakowo,
powoduje namnażanie się bakterii niezbędnych do utrzymania prawidłowej biocenozy pochwy.

Wskazania Gynauxil, globulki dopochwowe, 10 szt.

Wyrób medyczny Gynauxil można stosować w celu

przywrócenia lub utrzymania właściwego pH pochwy w infekcjach bakteryjnych i grzybiczych.
złagodzenia objawów związanych z odczuciem suchości w pochwie, w tym wywołanej niedoborem estrogenów.
wsparcia naturalnej flory bakteryjnej pochwy, np. po antybiotykoterapii
przeciwdziałania stanom atrofii (zaniku) błony sluzowej pochwy

Dawkowanie Gynauxil, globulki dopochwowe, 10 szt.

Globulkę należy umieścić głęboko w pochwie.
Kobiety miesiączkujące/ w okresie rozrodczym: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez pięć kolejnych dni, począwszy od 1-go dnia po zakończeniu menstruacji. Kontynuować w ten sposób stosowanie przez 2 do 3 następujących po sobie cyklach menstruacyjnych lub do czasu uzyskania poprawy. Lekarz może zalecić odmienny sposób użycia, do którego należy się dostosować,
Kobiety w okresie menopauzy i po menopauzie: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez 10 kolejnych dni lub według wskazań lekarza.
Zrobić około 2-tygodniową przerwę, po której można wznowić stosowanie.
Jeśli pojawi się miesiączka, stosowanie należy przerwać i wznowić po zakończeniu menstruacji.
Globulki najlepiej zakładać na noc.

Przeciwwskazania Gynauxil, globulki dopochwowe, 10 szt.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować w trakcie menstruacji.
Po założeniu globulki nie podejmować współżycia płciowego.
Nie stosować globulek w leczeniu zakażeń narządów rodnych i stanów zapalnych.
Produkt przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25 °C
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje dodatkowe Gynauxil, globulki dopochwowe, 10 szt.

W przypadku krótkotrwałego przekroczenia temperatury przechowywania i zmiękniecia globulek, w celu zapewnienia odpowiednio twardej konsystencji umożliwiającej wyjęcie i aplikację globulki, należy wstawić produkt do lodówki na ok. 5-10 minut.
Jeżeli globulki przechowywane były w temperaturze powyżej 30 ° C, co spowodowało ich zmiękniecie, należy włożyć je do lodówki na ok. 5-10 minut w celu zestalenia, co umożliwi prawidłowe wydobycie i z gniazda i aplikację w pochwie.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

Nie stosować produktu łącznie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo.
Nie wykonywano badań zgodności produktu z materiałami antykoncepcji mechanicznej, takimi jak krążki, diafragmy czy wkładki domaciczne (lateks, poliuretan), dlatego nie zaleca się stosowania równocześnie z tymi środkami.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży i matki karmiące mogą stosować produkt wyłącznie po konsultacji z lekarzem ginekologiem.