

Gynoxin Optima, 200 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 3 szt. (import równoległy, InPharm)

Cena: 41,49 zł



Opis słownikowy

Postać	kapsułki dopochwowe
Producent	Inpharm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Fentikonazol

Opis produktu

Informacje podstawowe Gynoxin Optima, 200 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 3 szt. (import równoległy, InPharm)

Gynoxin Optima to lek stosowany w infekcjach intymnych. Produkt ma formę kapsułek dopochwowych, zawierających fentikonazol o szerokim zakresie działania w drożdżycy miejsc intymnych oraz mieszanych infekcjach pochwy, ponieważ hamuje rozwój bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Gynoxin Optima przeznaczony jest dla kobiet powyżej 16. roku życia.

Skład Gynoxin Optima, 200 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 3 szt. (import równoległy, InPharm)

Substancją? czynną? leku jest azotan fentikonazolu (*Fenticonazoli nitras*).

1 kapsu?ka dopochwowa zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu.

Substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów t?uszczowych o ?redniej d?ugo?ci ?a?cucha, krzemionka koloidalna, ?elatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy

(E 217).

Działanie Gynoxin Optima, 200 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 3 szt. (import równoległy, InPharm)

Gynoxin Optima zawiera substancję czynną fentikonazol, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze oraz przeciwbakteryjne (bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne).

Wskazania Gynoxin Optima, 200 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 3 szt. (import równoległy, InPharm)

Lek Gynoxin Optima stosuje się w drożdżycy błon śluzowych narządów płciowych, jak: grzybicze zapalenie pochwy, grzybicze zapalenie sromu, upławy. Wskazaniem do zastosowania kapsułek dopochwowych jest także leczenie mieszanych zakażeń pochwy. Tego typu infekcje intymne mogą objawiać się silnym świądem okolic intymnych czy bólem w czasie stosunku albo oddawania moczu.

Dawkowanie Gynoxin Optima, 200 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 3 szt. (import równoległy, InPharm)

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjentki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki dopochwowe leku Gynoxin Optima są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie należy przyjmować kapsułek dopochwowych doustnie.

Zwykle stosowana dawka leku Gynoxin Optima to 1 kapsułka dopochwowa stosowana raz na dobę przez trzy kolejne dni. Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem.

Przeciwwskazania Gynoxin Optima, 200 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 3 szt. (import równoległy, InPharm)

Leku Gynoxin Optima nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.

Informacje dodatkowe Gynoxin Optima, 200 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 3 szt. (import równoległy, InPharm)

Stosowanie leku należy omówić z lekarzem jeśli u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:

nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
upławy zabarwione krwią,
rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
ból w dolnej części brzucha oraz ból przy oddawaniu moczu,
działania niepożądane takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, które są związane z leczeniem.
Gynoxin Optima zawiera oleje, które mogą uszkadzać lateksowe środki antykoncepcyjne (prezerwatywy, krążki).

Gynoxin Optima zawiera etylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan sodowy. Substancje te mogą powodować podrażnienia.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.