

Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, InPharm)

Cena: 32,99 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------|
| Postać | kapsułki dopochwowe |
| Producent | Inpharm |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Fentikonazol |

Opis produktu

Informacje podstawowe Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, InPharm)

Gynoxin Uno to lek w formie kapsułki dopochwowej na mieszane i grzybicze zakażenia pochwy. Lek zawiera fentikonazol o szerokim spektrum działania przeciw grzybom, także przeciw drożdżakom, i niektórym bakteriom wywołującym infekcje intymne. Gynoxin Uno stosuje się w drożdżycy narządów płciowych, w tym grzybicy pochwy, oraz zakażeniach mieszanych. Terapia Gynoxinem Uno polega na aplikacji dopochwowo tylko 1 kapsułki. Produkt leczniczy przeznaczony dla kobiet w wieku powyżej 16 lat.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o produktach z importu równoległego

Skład Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, InPharm)

Substancją? czynną? leku jest azotan fentikonazolu (*Fenticonazoli nitras*).

1 kapsu?ka dopochwowa, mi?kka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu.

Substancje pomocnicze: parafina ciekła, wazelina biała, lecytyna sojowa, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Działanie Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, InPharm)

Gynoxin Uno zawiera fentikonazol, będący pochodną imidazolu, który posiada szerokie spektrum działania wobec grzybów, także przeciw drożdżakom. Substancja ta jest aktywna również wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Globulki dopochwowe usuwają także objawy infekcji intymnej.

Wskazania Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, InPharm)

Wskazaniem do zastosowania Gynoxin Uno jest drożdżycza błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Infekcji intymnej mogą towarzyszyć takie objawy jak: dokuczliwy świąd okolic intymnych albo ból podczas oddawania moczu i stosunku. Gynoxin Uno można stosować również w infekcji mieszanej.

Dawkowanie Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, InPharm)

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjentki w wieku powyżej 60 lat, przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Lek stosuje się dopochwowo. Kapsułek dopochwowych nie można przyjmować doustnie. Gynoxin Uno należy umieścić głęboko w pochwie. Jeśli po 7 dniach pacjentka czuje się gorzej albo objawy nie ustępują, to należy skonsultować się z lekarzem.

Zwykle stosowane dawkowanie u kobiet dorosłych i w wieku powyżej 16 lat to 1 kapsułka dopochwowa wieczorem przed snem. W przypadku, gdy objawy utrzymują się po 1 aplikacji to po 3 dniach można zastosować kolejną kapsułkę dopochwową.

Przeciwwskazania Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, InPharm)

Leku nie należy stosować u pacjentek uczulonych na substancję czynną lub inny z pozostałych składników.