

Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, Pharmavitae)



Cena: 34,49 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Marka | Gynoxin |
| Postać | globulki |
| Producent | PHARMAVITAE SP. Z O.O. SP.K. |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Fentikonazol |

Opis produktu

Informacje podstawowe Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, Pharmavitae)

Gynoxin Uno to lek przeciwgrzybiczy w formie kapsułki dopochwowej. Lek zawiera fentikonazol o szerokim spektrum działania przeciw grzybom, także przeciw drożdżakom, wywołującym infekcje intymne. Genoxin Uno stosuje się w drożdżycy narządów płciowych, w tym grzybicy pochwy, aplikując 1 kapsułkę dopochwową u kobiet w wieku powyżej 16 lat.

Skład Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, Pharmavitae)

Substancj? czynn? leku jest azotan fentikonazolu (*Fenticonazoli nitras*).

1 kapsu?ka dopochwowa, mi?kka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu.

Substancje pomocnicze: parafina ciek?a, wazelina bia?a, lecytyna sojowa, ?elatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu

parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Działanie Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, Pharmavita)

Gynoxin Uno zawiera fentikonazol, będący pochodną imidazolu, który posiada szerokie spektrum działania wobec grzybów, także przeciw drożdżakom. Substancja ta jest aktywna również wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Globulki dopochwowe usuwają także objawy infekcji intymnej.

Wskazania Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, Pharmavita)

Wskazaniem do zastosowania Gynoxin Uno jest drożdżycza błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Infekcji intymnej mogą towarzyszyć takie objawy jak: dokuczliwy świąd okolic intymnych albo ból podczas oddawania moczu i stosunku.

Dawkowanie Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, Pharmavita)

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjentki w wieku powyżej 60 lat, przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Lek stosuje się dopochwowo. Kapsułek dopochwowych nie można przyjmować doustnie. Gynoxin Uno należy umieścić głęboko w pochwie. Jeśli po 7 dniach pacjentka czuje się gorzej albo objawy nie ustępują, to należy skonsultować się z lekarzem.

Zwykle stosowane dawkowanie u kobiet dorosłych i w wieku powyżej 16 lat to 1 kapsułka dopochwowa wieczorem przed snem. W przypadku, gdy objawy utrzymują się po 1 aplikacji to po 3 dniach można zastosować kolejną kapsułkę dopochwową.

Przeciwwskazania Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, Pharmavita)

Leku nie należy stosować u pacjentek uczulonych na substancję czynną lub inny z pozostałych składników.

Informacje dodatkowe Gynoxin Uno, 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie, 1 szt. (import równoległy, Pharmavita)

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

pacjentka jest w wieku powyżej 60 lat,
zakażenie pojawiło się po raz pierwszy lub w ciągu ostatniego roku wystąpiły już 4 drożdżycze,
stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne z lateksu – podczas terapii zaleca się inne metody,
pacjentka albo jej partner kiedykolwiek przechodzili chorobę przenoszoną drogą płciową,
kobieta jest uczulona na imidazol albo inne przeciwgrzybicze leki dopochwowe,
u pacjentki wystąpił którykolwiek z objawów: nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia, upławy zabarwione krwią, krwawienie z pochwy i (lub) ból w ramionach, rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze, ból w dolnej części brzucha, ból pleców oraz ból

przy oddawaniu moczu, gorączka ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), cuchnące upławy, nudności, działania niepożądane, takie jak: podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, świąd, wysypka, które są związane z leczeniem.
Jeśli kapsułka dopochwowa zostanie połamana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem albo udać się do najbliższego szpitala.

Jeśli partner także został zakażony, to on również powinien poddać się terapii.

Gynoxin Uno zawiera etylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan sodowy, które mogą powodować reakcje alergiczne, także późnego typu. Jeśli pojawi się miejscowe podrażnienie albo reakcji alergicznej to należy przerwać stosowanie leku.

Przechowywanie:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C .

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.