Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Hascosept, 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100 g

Cena: 22,59 zł

Opis słownikowy

Marka	Hascosept
Postać	płyn
Producent	Hasco
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Benzydamina

Opis produktu

Wskazania Hascosept, 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100 g

Produkt leczniczy Hascosept płyn jest wskazany do miejscowego leczenia: dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, jak również po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii. Lek przeznaczony jest do podania miejscowego.

Działanie Hascosept, 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100 g

Hascosept to lek na ból gardła w formie płynu do płukania. Działa nie tylko na objawy, ale też na wszystkie przyczyny bólu gardła(1). Leczy ból gardła, obrzęk, zaczerwienienie, zabija wirusy, bakterie i grzyby(2).

- Hascosept płyn do płukania gardła to sprawdzony i bezpieczny lek na ból gardła. Substancją czynną leku jest benzydamina - substancja szeroko przebadana w badaniach klinicznych, o ugruntowanej pozycji w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła – stosowana od niemal 60 lat.
- Kompleksowy lek na ból gardła, leczy objawy (ból, obrzęk, zaczerwienienie) stanów zapalnych gardła oraz zwalcza ich przyczyny (wirusy, bakterie i grzyby).
- Płyn z łatwością dociera do miejsca objętego procesem zapalnym, poprzez płukanie jamy ustnej i gardła.
- Ma przyjemny, orzeźwiający miętowy smak.
- Wydajne, ekonomiczne opakowanie leku Hascosept płyn wraz z dołączoną miarką.

(1) Dotyczy bólu gardła w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych.
(2) CHPL Hascosept.

Skład Hascosept, 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100 g

1 g roztworu zawiera 1,5 mg benzydaminy chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: błękit patentowy (E 131), żółcień chinolinowa (E 104), aromat miętowy, glicerol, etanol 96%, sacharyna, sodu wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Postać farmaceutyczna: roztwór barwy intensywnie zielonej.

Dawkowanie Hascosept, 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100 g

Lek przeznaczony jest do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Dawkowanie
Płukać 2 do 3 razy na dobę jamę ustną i gardło stosując 15 ml (1 łyżka) nierozcieńczonego roztworu lub rozcieńczonego niewielką ilością wody.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Pominięcie zastosowania leku Hascosept płyn
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania Hascosept, 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100 g

Kiedy nie stosować leku Hascosept?
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Informacje dodatkowe Hascosept, 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100 g

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję alergiczną. W takim przypadku lek Hascosept należy odstawić i zasięgnąć porady do lekarza, który zaleci odpowiednie postępowanie.

Lek Hascosept a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie są znane oddziaływania leku Hascosept z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek należy stosować ostrożnie w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak badań dotyczących wpływu leku Hascosept na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Hascosept płyn zawiera etanol 96%
Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu) – mniej niż 100 mg na dawkę.

Przedawkowanie:
Lek po zastosowaniu miejscowym praktycznie nie działa ogólnie, tak więc ryzyko przedawkowania jest minimalne. W razie zażycia dawki większej niż zalecana lub przypadkowego połknięcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przypadkowe połknięcie małej objętości roztworu do płukania jamy ustnej Hascosept nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Niemniej, w razie połknięcia (np. przez dzieci) bardzo dużej ilości leku Hascosept mogą wystąpić: wymioty, bóle brzucha, niepokój, lęk, drgawki,

zaburzenia koordynacji ruchowej, gorączka, przyspieszenie czynności serca i ewentualne zahamowanie czynności ośrodka oddechowego. W razie wystąpienia objawów przedawkowania zaleca się leczenie objawowe (np. wspomaganie oddychania, detoksykacja przez płukanie żołądka itp.).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, również Hascosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia.

Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólnoustrojowe działania niepożądane występują rzadko.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) lub o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej,
- zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty,
- zaburzenia układu immunologicznego: reakcja alergiczna (nadwrażliwość), reakcje nadwrażliwości,
- zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy,
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

Ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła oraz które mogą być potencjalnie zagrażające życiu.

Przechowywanie / Okres ważności:

- Płyn Hascosept należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25˚C.
- Okres przechowywania po pierwszym otwarciu wynosi 12 miesięcy.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław
Informacja o leku
tel. 22 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Galeria

Hascosept®
Hascosept to lek, który zwalcza objawy,
a gdy inni na tym kończą on działa dalej
– zwalcza też przyczyny.1,2

Hascosept® płyn bez trudu dociera do miejsc objętych stanem zapalnym.
Zawiera benzydaminę - substancję o działaniu potwierdzonym badaniami klinicznymi.
Do płukania gardła i jamy ustnej
Przyjemny, miętowy, orzeźwiający smak.


Hascosept® płyn zawiera chlorowodorek benzydaminy, który działa²:
Przeciwbólowo i przeciwzapalnie
Przeciwobrzękowo
Odkażająco
Miejscowo znieczulająco