Heel-Neurexan, tabletki, 50 szt

Cena: 25,57 zł

Opis słownikowy

Marka	Heel
Postać	tabletki
Producent	Heel
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Męczennica, Owies

Opis produktu

Informacje podstawowe Heel-Neurexan, tabletki, 50 szt

Neurexan to homeopatyczny produkt leczniczy stosowany w przypadku występowania problemów ze snem oraz stresu i napięcia nerwowego.

Skład Heel-Neurexan, tabletki, 50 szt

Substancjami czynnymi są: Avena sativa (Owies zwyczajny) D2, Passiflora incarnata (Męczennica cielista) D2, Coffea arabica (Kawa arabska) D12, Zincum isovalerianicum (Izowalerian cynku) D4.

1 tabletka zawiera:
Avena sativa D2 – 0,6 mg,
Passilofra incarnata D2 – 0,6 mg,
Coffea arabica D12 – 0,6 mg,
Zincum isovalerianicum D4 – 0,6 mg.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna i stearynian magnezu.

Wskazania Heel-Neurexan, tabletki, 50 szt

Zaburzenia snu i stany wzmożonego napięcia nerwowego.

Dawkowanie Heel-Neurexan, tabletki, 50 szt

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę Neurexanu należy przytrzymać w ustach by uległa rozpuszczeniu przed połknięciem.
Lek przyjąć minimum 30 minut przed posiłkiem.
W przypadku dzieci tabletkę można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Dorośli i młodzież od 12 lat: 1 tabletka 3 razy dziennie. W przypadku nasilonych objawów można zacząć od stosowania większej dawki — 1 tabletka co ½–1 godzinę. Nie przekraczać dawki 12 tabletek na dobę. Leczenie należy kontynuować zwykłą zalecaną dawką.

Dzieci poniżej 12 lat: stosować zgodnie z zalecaniami lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

Przeciwwskazania Heel-Neurexan, tabletki, 50 szt

Kiedy nie stosować leku homeopatycznego Neurexan:

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Informacje dodatkowe Heel-Neurexan, tabletki, 50 szt

Neurexan zawiera laktozę.

Przechowywanie:

Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. U dzieci poniżej 12 roku życia stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.