

# Heel-Nux Vomica-Homaccord, krople, 30 ml



Cena: 48,59 zł

## Opis słownikowy

Marka	Heel
Postać	krople
Producent	Heel
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Homeopatyczny produkt leczniczy

## Opis produktu

## Opis Heel-Nux Vomica-Homaccord, krople, 30 ml

### Opis

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

### Skład

100 g kropli zawiera:

Substancje czynne:

Strychnos nux-vomica 1)6 0,2g, Strychnos nux-vomica D10 0,2g, Strychnos nux-vomica D15 0,2g, Strychnos nux-vomica D30 0,2g, Strychnos nux-vomica 1)200 0,2g, Strychnos nux-vomica D1000 0,2g, Bryonia crética D4 0,2g, Bryonia crética D6 0,2g, Bryonia crética D10 0,2g, Bryonia crética D1 5 0,2g, Bryonia crética D30 0,2g, Bryonia crética D200 0,2g, Bryonia crética D1000 0,2g, Lycopodium clavatum D4 0,3g, Lycopodium clavatum D10 0,3g, Lycopodium clavatum D30 0,3g, Lycopodium clavatum D200 0,3g, Lycopodium clavatum D1000 0,3g, Citrullus colocynthis D4 0,3g, Citrullus colocynthis D10 0,3g, Citrullus colocynthis D30 0,3g, Citrullus colocynthis D200 0,3g.

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, etanol.

Zawiera 35% (v/v) etanolu.

### Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie. Krople można mieszać z niewielką ilością wody.

### Wskazania

Nux vomica-Homaccord krople doustne, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w łagodnych dolegliwościach trawiennych (wzdęcia, odbijania).

### Przeciwwskazania

- Lek jest szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu.
- Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u kobiet w ciąży, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu).

### Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

### Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować pomiędzy posiłkami.

### Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie podawać leku dzieciom poniżej 12 roku życia.