

## Humana 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 90 ml x 24 szt..



Cena: 187,99 zł

### Opis słownikowy

Marka	Humana
Postać	płyn
Producent	Humana
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Humana 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 90 ml x 24 szt..

Humana 1, płyn w butelce plastikowej, 90 ml x 24 sztuki

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego  
mleko początkowe

## Skład Humana 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 90 ml x 24 szt..

odmineralizowana woda, odtuszczone mleko, odmineralizowana serwatka z mleka z proszku, oleje roślinne, laktoza z mleka, syrop galaktooligosacharydowy (z mleka), emulgator: mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych, węglan wapnia, chlorek potasu, ortofosforan wapnia, cytrynian sodu, zestaw witamin (witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina A, tiamina, witamina B6, kwas foliowy,

witamina K, ryboflawina, biotyna, witamina D, witamina B12), L-fenylalanina, tauryna, tlenek magnezu, mleczan żelazowy, nukleotydy (5'-monofosforan cytydyny, 5'-monofosforan urydyny, 5'-monofosforan adenozyiny, 5'-monofosforan inozyiny, 5'-monofosforan guanozyiny), cytrynian potasu, siarczan cynku, L-tryptofan, siarczan miedzi, jodan potasu, siarczan manganu, selenian sodu.

Zawiera laktoz?.

Wartości odżywcze	100 ml gotowego spożycia
Wartość energetyczna	275 kJ/ 66 kcal
Tłuszcze, w tym	3,2 g
nasycone kwasy tłuszczowe	1,2 g
jednonienasycone kwasy tłuszczowe	1,4 g
wielonienasycone kwasy tłuszczowe	0,6 g
kwasy linolowy	558 mg
kwasy alfa-linolenowy	61 mg
kwasy arachidonowy	6,4 mg
kwasy dokozaheksaenowy	6,4 mg
węglowodany, w tym	7,6 g
laktoza	7,4 g
bezonnik pokarmowy	0,5 g
Galaktooligosacharydy GOS	0,5 g
białko	1,4 g
sól	0,05 g
składniki mineralne:	
sód	20 mg
potas	70 mg
chlorki	46 mg
wapń	61 mg
fosfor	33 mg
magnez	5 mg
żelazo	0,6 mg
cynk	0,7 mg

mied?	0,044 mg
jod	14 µg
mangan	0,0068 mg
selen	1,9 µg
fluorki	0,01 mg
witamina A	65 µg
witamina D	1 µg
witamina E	1 mg
witamina K	4,5 µg
tiamina (witamina B <sub>1</sub> )	0,068 mg
ryboflawina (witamina B <sub>2</sub> )	0,12 mg
witamina B <sub>6</sub>	0,065 mg
witamina B <sub>12</sub>	0,17 µg
witamina C	10 mg
niacyna	0,595 mg
kwask pantotenowy	0,375 mg
kwask foliowy	10 µg
biotyna	2,1 µg
nukleotydy	1,7 mg
tauryna	4,9 mg
cholina	15 mg
inozytol	4,6 mg
Osmoralno??	290 mosmol/l
Nerkowy ?adunek osmotyczny	96 mosmol/l.

## Działanie Humana 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 90 ml x 24 szt..

Humana 1 płyn w butelce plastikowej

zalecane od urodzenia jako uzupełnienie karmienia piersią lub wyłącznego karmienia, przez okres karmienia innym mlekiem, niż mleko matki,

mleko można wprowadzać w każdym dowolnym momencie okresu niemowlęcego,

ze względu na zrównoważony skład, mleko początkowe Humana 1 można podawać w ilości i z częstotliwością regulowaną przez dziecko,

zawiera łatwo przyswajalne węglowodany,

przy zaburzeniach tolerancji glukozy stosuje się z zalecenia lekarza i pod kontrolą wskaźników przemiany materii.

## Wskazania Humana 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 90 ml x 24 szt..

Środek spożywczy Humana 1 zalecany jest od urodzenia jako uzupełnienie karmienia piersią lub wyłącznego karmienia, gdy karmienie mlekiem matki z przyczyn medycznych lub innych jest niemożliwe.

## Dawkowanie Humana 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 90 ml x 24 szt..

mleko gotowe do użycia.

przed użyciem buteleczki mleka początkowego Humana 1 w płynie należy sprawdzić stan folii pod nakrętką. Jeżeli folia jest wypukła, produktu nie wolno użyć.

ważne: buteleczkę z mlekiem przed użyciem energicznie wstrząsać przez 10 sekund.

odkręcić nakrętkę i usunąć folię, nałożyć sterylny smoczek lub podzielić mleko na mniejsze porcje do sterylnych buteleczek.

w przypadku podgrzewania mleka w buteleczce nie należy podawać niewykorzystanej, powtórnie podgrzanej.

## Informacje dodatkowe Humana 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 90 ml x 24 szt..

Nie stosować w przypadku: nietolerancji mleka krowiego, alergii na białka mleka krowiego, nietolerancji laktozy, galaktozemii, zaburzeń wchłaniania glukozy i galaktozy.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu karmienia mlekiem modyfikowanym należy skonsultować się z lekarzem pediatrą.

Nie należy pozostawiać dziecku butelki ze smoczkiem do długotrwałego ssania (uwaga: zagrożenie rozwoju próchnicy).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-25°C.