

## Ibalgin Sport, 50 mg+200 j.m./g krem, 50 g

Cena: 20,19 zł



### Opis słownikowy

Postać	krem
Producent	Zentiva
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Heparynoid, Ibuprofen

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Ibalgin Sport, 50 mg+200 j.m./g krem, 50 g

Ibalgin Sport to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym do stosowania w chorobach stawów, a także stanów zapalnych żył, bólu mięśni, ścięgien oraz w urazach i stłuczeniach.

### Skład Ibalgin Sport, 50 mg+200 j.m./g krem, 50 g

Substancjami czynnymi s?: ibuprofen (*Ibuprofenum*), heparynoid (*Heparynoidum*).

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu i 200 j.m. heparynoidu.

Substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów t?uszczowych o ?redniej d?ugo?ci ?a?cucha, makroglu eter stearylowy, makroglu eter stearylowy 1050, hydroksyetyloceluloza, kwas stearynowy, alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), glikol

propylenowy, woda oczyszczona.

## Działanie Ibalgin Sport, 50 mg+200 j.m./g krem, 50 g

Ibalgin Sport wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne (zmniejsza stan zapalny), dodatkowo zmniejsza obrzęk dzięki zawartości ibuprofenu w kremie. Heparynoid przyspiesza wchłanianie się wybroczyn, krwiaków, wzmacnia działanie przeciwzapalne, zapobiega powstawaniu zakrzepów, wspomaga leczenie zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych. W podaniu miejscowym, heparynoid działa również przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

## Wskazania Ibalgin Sport, 50 mg+200 j.m./g krem, 50 g

- objawy zapalne ostrych i przewlekłych chorób reumatoidalnych,
- ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa
- jako środek pomocniczy w leczeniu schorzeń takich jak: zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, zapalenie żył wędrujące, zapalenie żyłaków, zmiany miejscowe wywołane leczeniem obliteracyjnym żyłaków, zapalenie ścięgien oraz zapalenie mięśni i powięzi, leczenie zmian pourazowych powstałych np. przy uprawianiu sportu, takich jak obrzęki, stłuczenia, krwiaki pourazowe, urazy stawów, uszkodzenia tkanek okołostawowych.

## Dawkowanie Ibalgin Sport, 50 mg+200 j.m./g krem, 50 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania miejscowego na skórę.

**Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:** 2-3 razy na dobę rozprowadzić cienką warstwę kremu, a następnie wetrzeć. Kremu nie należy stosować częściej niż co 4 godziny.

W przypadku leczenia bolesnych, rozległych **krwiaków** zaleca się stosowanie kremu pod tzw. opatrunkiem okluzyjnym, najlepiej na noc.

W przypadku **schorzeń** na chore miejsca można zastosować na noc opatrunek uciskowy.

## Przeciwwskazania Ibalgin Sport, 50 mg+200 j.m./g krem, 50 g

Kiedy nie stosować leku Ibalgin Sport:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, heparynoid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u pacjentów, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa,
- na otwarte rany, zmienioną powierzchnię skóry, błony śluzowe i do oczu.

## Informacje dodatkowe Ibalgin Sport, 50 mg+200 j.m./g krem, 50 g

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować leku w przypadku małopłytkowości, różnego rodzaju stanów związanych ze skłonnością do krwawień.
- Nie stosować na duże powierzchnie ciała (potencjalny wpływ na wynik OB).
- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z wystąpieniem zmian skórnych - zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień. W momencie wystąpienia wymienionych zmian - lek odstawić.
- Po każdorazowej aplikacji, należy umyć ręce.
- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem jeśli występują zaburzenia czynności nerek, zaburzenia żołądka i jelit.
- Ibalgin Sport zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, dlatego może powodować reakcje alergiczne (tzw. reakcje typu późnego).
- Lek zawiera także glikol propylenowy, dlatego może powodować podrażnienie skóry.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

### Ibalgin Sport może wchodzić w interakcje z:

- ASA (kwas acetylosalicylowy),
- lekami przeciwzakrzepowymi,
- tetracykliną, hydrokortyzonem (niezgodność z heparynoidem).

### Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku długotrwałe na duże powierzchnie ciała u kobiet w okresie ciąży.

W ostatnich trzech miesiącach ciąży nie zaleca się stosowania leku.

Kobiety karmiące piersią powinny stosować lek jedynie przez krótki czas i na niewielkiej powierzchni ciała

### Wpływ na badania laboratoryjne

Stosowanie na duże powierzchnie ciała może mieć wpływ na wynik OB.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Producent  
ZENTIVA  
Bonifraterska 17  
Warszawa