

Iberogast, płyn doustny, 100 ml



Cena: 94,49 zł

Opis słownikowy

Marka	Iberogast
Postać	krople
Producent	Bayer
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kminek, Lukrecja, Mięta, Ostropest

Opis produktu

Informacje podstawowe Iberogast, płyn doustny, 100 ml

Iberogast jest lekiem roślinnym do stosowania w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, związanych z motoryką (pasażem) przewodu pokarmowego.

LMR – 20220907-208

Skład Iberogast, płyn doustny, 100 ml

100 ml płynu zawiera:

Iberis amara herbae extractum (wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego) (1:1,5-2,5) 15,0 ml ekstrahent - etanol 50% (v/v)

Angelicae radice extractum (wyciąg z korzenia arcydzięgla) (1:2,5-3,5) 10,0 ml ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Matricariae flos extractum (wyci?g z kwiatu rumianku) (1:2-4) 20,0 ml
ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Carvi fructus extractum (wyci?g z owocu kminku) (1:2,5-3,5) 10,0 ml
ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Silybi mariani fructus extractum (wyci?g z owocu ostropestu) (1:2,5-3,5) 10,0 ml
ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Melissae folii extractum (wyci?g z li?ci melisy) (1:2,5-3,5) 10,0 ml
ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Menthae piperitae folii extractum (wyci?g z li?ci mi?ty pieprzowej) (1:2,5-3,5) 5,0 ml
ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Chelidonii herbae extractum (wyci?g z ziela glistnika) (1:2,5-3,5) 10,0 ml
ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Liquiritiae radicis extractum (wyci?g z korzenia lukrecji) (1:2,5-3,5) 10,0 ml
ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

Działanie Iberogast, płyn doustny, 100 ml

Iberogast łagodzi uczucie pełności, wzdęcia, osłabia skurcze żołądka i jelit. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne.

Wskazania Iberogast, płyn doustny, 100 ml

Iberogast jest lekiem roślinnym do stosowania w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, związanych z motoryką (pasażem) przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja (niestrawność) czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą.

Dawkowanie Iberogast, płyn doustny, 100 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, **Iberogast** przyjmuje się w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków.

Zalecana dawka leku Iberogast to:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 20 kropli.

Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli.

Dzieci poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:

Jeśli po 7 dniach stosowania leku dolegliwości nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny.

Wstrzęsnąć przed użyciem

Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność płynu **Iberogast**.

Przeciwwskazania Iberogast, płyn doustny, 100 ml

Kiedy nie stosować leku Iberogast:

jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku
nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat

U dzieci poniżej 6 lat każdy ból brzucha powinien być konsultowany z lekarzem.

Informacje dodatkowe Iberogast, płyn doustny, 100 ml

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000) mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości takie jak np. wysypka, świąd, duszność.

W przypadku leków jednoskładnikowych zawierających ziele glistnika (*Chelidonium majus*) występowały bardzo rzadkie przypadki odwracalnego uszkodzenia wątroby. Takich niepożądanych reakcji na lek nie zaobserwowano w przypadku produktu Iberogast.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli po 7 dniach stosowania leku dolegliwości nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny.

Pacjenci ze stwierdzoną chorobą wątroby powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Iberogast. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje nie są znane.

Stosowanie leku z jedzeniem i pić

Ze względu na zawartość alkoholu Iberogast nie jest przeznaczony i nie powinien być stosowany u osób z chorobą alkoholową. Lek Iberogast zawiera etanol (alkohol) w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Jednorazowa dawka leku dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada ok. 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawke.

Dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iberogast.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży albo planuje dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 6 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Pojedyncza dawka dla dorosłych zawiera do 240 mg alkoholu (etanolu). Jeśli lek Iberogast stosowany jest zgodnie z zaleceniami nie powinien mieć istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Galeria

Ten sam skład. Nowe opakowanie



Przyjmuj w małej ilości wody lub soku

