

Iberogast, płyn doustny, 20 ml



Cena: 39,49 zł

Opis słownikowy

Marka	Iberogast
Postać	krople
Producent	Bayer
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Arcydzięgiel, Etanol, Glistnik, Kminek, Lukrecja, Melisa, Mięta, Ostropest, Rumianek

Opis produktu

Informacje podstawowe Iberogast, płyn doustny, 20 ml

Iberogast to produkt leczniczy roślinny do stosowania w przypadku różnych dolegliwości przewodu pokarmowego jak niestrawność, zespół jelita drażliwego, wzdęcia, nudności, zgaga.

Skład Iberogast, płyn doustny, 20 ml

Substancjami czynnymi s?: wyci?g z ziela ubiorka gorzkiego, wyci?g z korzenia arcydzi?gla, wyci?g z kwiatu rumianku, wyci?g z owocu kminku, wyci?g z owocu ostropestu, wyci?g z li?ci melisy, wyci?g z li?ci mi?ty pieprzowej, wyci?g z ziela glistnika, wyci?g z korzenia lukrecji.

100 ml p?ynu zawiera:

- *Iberis amara herbae extractum* (wyci?g z ziela ubiorka gorzkiego) (1:1,5-2,5; ekstrahent - etanol 50% (v/v)) 15,0 ml
- *Angelicae radice extractum* (wyci?g z korzenia arcydzi?gla) (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% (v/v)) 10,0 ml
- *Matricariae flos extractum* (wyci?g z kwiatu rumianku) (1:2,-4; ekstrahent - etanol 30% (v/v)) 20,0 ml
- *Carvi fructus extractum* (wyci?g z owocu kminku) (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% (v/v)) 10,0 ml
- *Silybi mariani fructus extractum* (wyci?g z owocu ostropestu) (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% (v/v)) 10,0 ml
- *Melissae folii extractum* (wyci?g z li?ci melisy) (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% (v/v)) 10,0 ml
- *Menthae piperitae folii extractum* (wyci?g z li?ci pieprzowej) (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% (v/v)) 5,0 ml
- *Chelidonii herbae extractum* (wyci?g z ziela glistnika) (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% (v/v)) 10,0 ml
- *Liquiritiae radice extractum* (wyci?g z korzenia lukrecji) (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% (v/v)) 10,0 ml.

Iberogast zawiera 29,5 - 32,6 % (v/v) etanolu.

Obecno?? osadu czy zm?tnienie nie wyp?ywaj? na skuteczno?? leku.

Działanie Iberogast, płyn doustny, 20 ml

Iberogast wykazuje działanie wiatropędne, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Wskazania Iberogast, płyn doustny, 20 ml

zaburzenia czynnościowe związane z motoryką przewodu pokarmowego (dyspepsja czynnościowa, zespół jelita drażliwego), objawy towarzyszące powyższym zaburzeniom jak: dolegliwości skurczowe jamy brzusznej i jelit, ból brzucha, uczucie pełności, wzdęcia, nudności, zgaga.

Dawkowanie Iberogast, płyn doustny, 20 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

W przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów po 7 dniach stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci od 6 do 12 lat: 3 x dziennie po 15 kropli.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 x dziennie po 20 kropli.

Przeciwwskazania Iberogast, płyn doustny, 20 ml

Kiedy nie stosować leku Iberogast:

w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników tego leku,
u dzieci poniżej 6 lat (wyłącznie po konsultacji z lekarzem).

Informacje dodatkowe Iberogast, płyn doustny, 20 ml

Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonych chorób wątroby.
Lek zawiera alkohol i nie powinien być stosowany w przypadku choroby alkoholowej.
Stosowanie leku w przypadku dzieci z padaczką i chorobami wątroby powinno być omówione z lekarzem.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Galeria

Ten sam skład.
Nowe opakowanie



Przyjmuj w małej
ilości wody lub soku

