

Ibum, 200 mg kapsułki elastyczne, 10 szt.

Cena: 11,69 zł



Opis słownikowy

Marka	Ibum
Postać	kapsułki
Producent	Hasco
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis Ibum, 200 mg kapsułki elastyczne, 10 szt.

Opis

Preparat działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Skład

1 tabletkę:
Ibuprofenum 200 mg

makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, woda oczyszczona, żółcień chinolinowa E 104, błękit patentowy E 131.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

Bóle różnego pochodzenia, bolesne miesiączkowanie i gorączka: 200-400 mg (1-2 kapsułki), w razie potrzeby co 4-6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg na dobę. Kapsułki należy popić szklanką wody; Leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni w leczeniu bólu i dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki, bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli mimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe i gorączka nasilają się lub występują nowe, dodatkowe objawy, po 2 dniach stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Wskazania

Preparat stosowany w bólach różnego pochodzenia o słabym i umiarkowanym nasileniu (ból głowy (w tym także migreny), ból zębów, ból mięśni, ból po urazach, nerwobóle), bolesne miesiączkowanie, stany gorączkowe.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku u pacjentów

- z nadwrażliwością na ibuprofen lub którykolwiek ze składników leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
- z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ.
- u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej.
- z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca.
- przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych)
- w ostatnich trzech miesiącach ciąży
- ze skaza krwotoczną
- u dzieci w wieku poniżej 12lat.

Działania niepożądane

Niezbyt często:

ból głowy, niestrawność, ból brzucha, nudności, pokrzywka, świąd.

Rzadko:

Biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia, obrzęki wynikające z zaburzeń nerek i dróg moczowych.

Bardzo rzadko:

smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja

W pojedynczych przypadkach opisywano:

- depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w surowicy
- zaburzenia czynności wątroby
- nieprawidłowa morfologia krwi
- rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa Johnsona, martwica toksyczno-rozplywna naskórka
- ciężkie reakcje nadwrażliwości

Przyjmowanie takich leków jak ibuprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca lub udaru.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku IBUM w przypadku stosowania innych leków z grupy NLPZ, innych leków przeciwbólowych albo kwasu acetylosalicylowego. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach nawet tych które wydawane są bez recepty.

W szczególności, przed przyjęciem ibuprofenu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków:

- kwas acetylosalicylowy w małej dawce (75mg), raz na dobę
- leki przeciwnadciśnieniowe albo leki moczopędne
- leki zmniejszające krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe lub leki przeciwplatekcyjne)
- kortykosteroidy
- metotreksat
- lit
- zydowudyna