

## Ibum forte, 200 mg/5 ml zawiesina doustna o smaku bananowym, 100 g

Cena: 40,59 zł



### Opis słownikowy

Marka	Ibum
Postać	syrop
Producent	Hasco
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Ibuprofen

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Ibum forte, 200 mg/5 ml zawiesina doustna o smaku bananowym, 100 g

Ibum Forte to produkt leczniczy w postaci syropu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. smak bananowy.

## Skład Ibum forte, 200 mg/5 ml zawiesina doustna o smaku bananowym, 100 g

Substancją czynną leku jest: ibuprofen.

5 ml zawiera 200 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoesan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat bananowy, woda oczyszczona.

## Działanie Ibum forte, 200 mg/5 ml zawiesina doustna o smaku bananowym, 100 g

Lek Ibum Forte łagodzi dolegliwości bólowe i gorączkowe.

## Wskazania Ibum forte, 200 mg/5 ml zawiesina doustna o smaku bananowym, 100 g

Lek Ibum Forte jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawowego:

gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego.  
ból różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego.

## Dawkowanie Ibum forte, 200 mg/5 ml zawiesina doustna o smaku bananowym, 100 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem butelki należy wstrząsnąć.

Wiek dziecka (masa ciała dziecka)	Dawka jednorazowa	Maksymalna dawka dobową
3-6 miesięcy (5-7,6 kg)	1,25 mg	3 razy po 1,25 ml = 150 mg
6-12 miesięcy (7,7-9 kg)	1,25 mg (50 mg)	3-4 razy po 1,25 ml = 150 - 200 mg
1-3 lat (10-15 kg)	2,5 ml (100 mg)	3 razy po 2,5 ml = 300 mg
4-6 lat (16-20 kg)	3,75 ml (150 mg)	3 razy po 3,75 ml = 450 mg
7-9 lat (21-29 kg)	5 mg (200 mg)	3 razy po 5 ml = 600 mg
10-12 lat (30-40 kg)	7,5 mg (300 mg)	3 razy po 7,5 ml = 900 mg
powyżej 40 kg	7,5-10 ml (300-400 mg)	3-4 razy po 7,5 ml = 900-1200 mg

## Przeciwwskazania Ibum forte, 200 mg/5 ml zawiesina doustna o smaku bananowym, 100 g

Kiedy nie stosować leku Ibum forte:

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,  
u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ,  
u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości jakiegokolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,  
jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,  
jeśli występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie,

jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu,  
jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

## Informacje dodatkowe Ibum forte, 200 mg/5 ml zawiesina doustna o smaku bananowym, 100 g

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ibum Forte i innych NLPZ,  
Podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne  
kortykosteroidy, leki rozrzedzające krew, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwplatekcyjne,  
Termin ważności po pierwszym użyciu: 6 miesięcy,  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C,  
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.