

Ibuprom Zatoki Max, 400 mg + 60 mg tabletki powlekane, 10 szt

Cena: 24,49 zł



Opis słownikowy

Marka	Ibuprom
Postać	tabletki
Producent	Us Pharmacia
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Ibuprofen, Pseudoefedryna

Opis produktu

Informacje podstawowe Ibuprom Zatoki Max, 400 mg + 60 mg tabletki powlekane, 10 szt

Ibuprom Zatoki Max jest stosowany w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie takich jak: ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe.

Skład Ibuprom Zatoki Max, 400 mg + 60 mg tabletki powlekane, 10 szt

Substancjami czynnymi leku są Ibuprofenum i Pseudoephedrinum hydrochloridum.

Jedna tabletki powlekana zawiera jako substancje czynne: Ibuprofen (Ibuprofenum) 400 mg, Pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrinum hydrochloridum) 60 mg.

Substancje pomocnicze: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypromeloza E-5, magnezu stearynian Skład otoczki: hypromeloza E-5, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień koszenilowa (E 124).

Działanie Ibuprom Zatoki Max, 400 mg + 60 mg tabletki powlekane, 10 szt

Produkt leczniczy Ibuprom Zatoki Max działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie oraz zmniejsza przekrwienie błony

śluzowej nosa.

Wskazania Ibuprom Zatoki Max, 400 mg + 60 mg tabletki powlekane, 10 szt

Ibuprom Zatoki Max jest wskazany do stosowania doraźnego w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia.

Dawkowanie Ibuprom Zatoki Max, 400 mg + 60 mg tabletki powlekane, 10 szt

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie. Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu 1 tabletka doustnie co 6-8 godzin (nie należy stosować ilości większej niż 3 tabletki na dobę).

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Nie wolno przyjmować leku przez okres ponad 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania Ibuprom Zatoki Max, 400 mg + 60 mg tabletki powlekane, 10 szt

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu oraz jeśli pacjent: przyjmuje kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); kiedykolwiek w przeszłości miał objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforację lub krwawienie; ma skazę krwotoczną; ma ciężką niewydolność wątroby; ma ciężką niewydolność nerek lub ciężką niewydolnością serca; przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne w tym inhibitory COX-2; ma ciężkie zaburzenia układu sercowo-naczyniowego; tachykardię; nadciśnienie tętnicze; dławicę piersiową; nadczynność tarczycy; cukrzyce; jaskrę z zamkniętym kątem; rozrost gruczołu krokowego; guza chromochłonnego nadnerczy.

Informacje dodatkowe Ibuprom Zatoki Max, 400 mg + 60 mg tabletki powlekane, 10 szt

Należy zachować ostrożność u pacjentów: u których występuje toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej; u których występują choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna); u których występuje nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca w wywiadzie; u których występuje zaburzenie czynności nerek; u których występuje zaburzenie czynności wątroby; u których występuje czynna lub w wywiadzie astma oskrzelowa oraz choroby alergiczne; w podeszłym wieku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Ibuprom Zatoki Max może wchodzić w interakcje z: lekami o działaniu przeciwzakrzepowym; niektórymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi; lekami moczopędnymi; kortykosteroidami (takimi jak prednizolon lub deksametazon); metotreksatem; litem (lekiem przeciwdepresyjnym); zydowudyną; inhibitorami MAO (np. selegilina); agonistami receptora dopaminowego; dopaminergicznymi lekami zwężającymi naczynia; dihydroergotaminą, ergotaminą, metylergometryną; linezolidem; chinidyną; trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi; lekami sympatykomimetycznymi udrażniającymi nos i zmniejszającymi apetyt; lekami sympatykomimetycznymi typu amfetamina.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićm

Lek należy przyjmować po posiłkach.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zastosowanie produktu Ibuprom Zatoki Max jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W czasie stosowania leku należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.