

Ibuprom Zatoki Sprint, 200 mg + 30 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Cena: 15,68 zł



Opis słownikowy

Marka	Ibuprom
Postać	kapsułki
Producent	Us Pharmacia
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Ibuprofen, Pseudoefedryna

Opis produktu

Informacje podstawowe Ibuprom Zatoki Sprint, 200 mg + 30 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Ibuprom Zatoki Sprint to lek do krótkotrwałego stosowania u dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorosłych w celu łagodzenia objawów grypy i przeziębienia - bólu, gorączki, niedrożności nosa i zatok przynosowych.

Skład Ibuprom Zatoki Sprint, 200 mg + 30 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Substancją czynną jest ibuprofen (Ibuprofenum) oraz pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrini hydrochloridum).

1 kapsułka miękka zawiera:
Ibuprofen (Ibuprofenum) 200 mg
Pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrini hydrochloridum) 30 mg

Substancje pomocnicze: makrogol 600; potasu wodorotlenek; woda oczyszczona; żelatyna; sorbitol, ciekły, częściowo odwodniony; naturalny Beta Karoten 10% CWD, proszek, o składzie (naturalny beta karoten (E160), skrobia spożywcza modyfikowana (E1450), dl-Alfa tokoferol (E307)); tusz drukarski, o składzie (szelak, żelaza tlenek, czarny (E172), alkohol N-butylovowy, glikol propylenowy, amonu wodorotlenek 28%).

Działanie Ibuprom Zatoki Sprint, 200 mg + 30 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Produkt leczniczy Ibuprom Zatoki Sprint działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa.

Wskazania Ibuprom Zatoki Sprint, 200 mg + 30 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Ibuprom Zatoki Sprint stosuje się w celu złagodzenia objawów związanych z przekrwieniem błony śluzowej nosa lub zatokowym bólem głowy, gorączką oraz bólem stawów i mięśni związanym z przeziębieniem i grypą.

Dawkowanie Ibuprom Zatoki Sprint, 200 mg + 30 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować tylko doustnie i krótkotrwale.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku:

1 do 2 kapsułek co 4 do 6 godzin, maksymalna dawka to 6 kapsułek w ciągu doby.

Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Przeciwwskazania Ibuprom Zatoki Sprint, 200 mg + 30 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Poza przeciwwskazaniami dotyczącymi łącznego stosowania z innym lekami, Ibupromu Zatoki Sprint nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt leczniczy nie jest zalecany u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, z czynnym lub nawracającym wrzodem trawiennym lub krwawieniami z przewodu pokarmowego, z udarem krwotocznym w wywiadzie, z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA), niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby. Nie należy go stosować u pacjentów, których występują choroby serca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, rozrost gruczołu krokowego, choroby naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, częstoskurcz lub skaza krwotoczna.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Informacje dodatkowe Ibuprom Zatoki Sprint, 200 mg + 30 mg kapsułki miękkie, 10 szt.

Lek Ibuprom Zatoki Sprint należy stosować jedynie, jeśli występuje zablokowanie nosa wraz z bólem głowy, bólem i (lub) gorączką jednocześnie. Nie należy go stosować, jeśli występuje tylko jeden z wymienionych objawów.

Lek zawiera 63 mg sorbitolu w 1 kapsułce. Przyjęcie leku należy skonsultować z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.

Jedna kapsułka leku Ibuprom Zatoki Sprint zawiera 21 mg potasu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować tego leku w przypadku przyjmowania: innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); leków obkurczających błonę śluzową (donosowych lub doustnych); w przeszłości lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni, leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (MAO); trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (stosowanych w leczeniu depresji).

Należy powiadomić lekarza jeśli pacjent przyjmuje:

leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak warfaryna, tyklopidyna, aspiryna/kwas acetylosalicylowy);

leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II

glikozydy nasercowe, takie jak digoksyne (digitalis) lub chinidyna stosowana w leczeniu chorób serca; – fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki);

lit (stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju);

metotreksat (stosowany w leczeniu zapalenia stawów);

leki zobojętniające (leki stosowane w leczeniu objawów wrzodu żołądka np. zgagi);

cyklosporyny (stosowane w celu osłabienia układu odpornościowego organizmu np. po przeszczepie);

mifepriston (stosowany do przerywania ciąży);

antybiotyki chinolonowe (stosowane w leczeniu szerokiego zakresu zakażeń);

takrolimus (lek stosowany po przeszczepie);

leki znane jako pochodne sulfonilomocznika, takie jak glibenklamid (stosowany w leczeniu cukrzycy);

kortykosteroidy (rodzaj leków przeciwzapalnych, np. hydrokortyzon);

selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny (SSRI, np. fluoksetyna) (leki stosowane w leczeniu depresji);

aminoglikozydy (np. gentamycyny lub amikacyna) (leki stosowane w leczeniu zakażeń);

lek antybakteryjny furazolidon (leki stosowane w leczeniu zakażeń);

zydowudynę (stosowany w leczeniu zakażeń HIV);

guanetydynę, rezerpinę lub metylodopę (leki stosowane w chorobach serca i układu krążenia);

sulfonpyrazon i probenecyd (leki stosowane w leczeniu dny);

leki moczopędne oszczędzające potas (leki stosowane w chorobach serca);

pochodne sporyszu (leki stosowane w leczeniu migreny);

agonistów receptora dopaminy (leki stosowane w leczeniu objawów choroby Parkinsona);

heparynę, Ginkgo biloba (stosowane w leczeniu zakrzepów).

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się

lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zastosowanie produktu Ibuprom Zatoki Sprint jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Jeśli występują problemy z zajściem w ciążę, należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku Ibuprom Zatoki Sprint nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Produkt leczniczy ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należy zachować ostrożność.