

Imodium Instant, 2 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 szt.



Cena: 15,89 zł

Opis słownikowy

Marka	Imodium
Postać	tabletki
Producent	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Łżecka 24 02-135 Warszawa
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Loperamid

Opis produktu

Informacje podstawowe Imodium Instant, 2 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 szt.

Imodium Instant to produkt leczniczy o działaniu przeciwbiegunkowym do stosowania w biegunce ostrej i przewlekłej.

Skład Imodium Instant, 2 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 szt.

Substancj? czynn? jest: chlorowodorek loperamidu (*Loperamidi hydrochloridum*).

1 tabletki zawiera 2 mg chlorowodoru loperamidu.

Substancje pomocnicze: ?elatyna, mannitol, aspartam, kompozycja smakowo-zapachowa mi?towa, sodu wodorow?glan.

Działanie Imodium Instant, 2 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 szt.

Imodium Instant należy do leków hamujących perystaltykę jelit, jest lekiem przeciwbiegunkowym. Loperamid zmniejsza m.in. natychmiastową potrzebę wypróżnienia.

Wskazania Imodium Instant, 2 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 szt.

ostra i przewlekła biegunka,
zmniejszenie liczby i objętości stolców u osób z wytworzoną przetoką jelita krętego,
objawowe leczenie biegunki w zespole jelita drażliwego.

Dawkowanie Imodium Instant, 2 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania doustnego.
- Tabletkę leku rozpada się w jamie ustnej, należy poczekać aż tabletkę rozpuści się i popić wodą. Nie wymaga popijania.
- Podczas leczenia biegunki należy pamiętać o odpowiednim uzupełnieniu płynów.

Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletkę (2 mg) dla dzieci, a następnie 1 tabletkę (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu.

Przewlekła biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletkę (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 mg do 12 mg) na dobę.

Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce - 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych i dzieci; u dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg masy ciała).

Leczenie objawowe ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego

Dorośli od 18 roku życia:

Początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu lub według dawkowania uprzednio zaleconego przez lekarza. Lek **Imodium Instant** można stosować przez okres do 2 tygodni przy powtarzających się atakach, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin przy pojedynczych napadach biegunki.

Dawka maksymalna w biegunce związanej z zespołem jelita drażliwego - 6 tabletek (12 mg) na dobę.

Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpiły w ciągu 48 godzin po zastosowaniu leku Imodium Instant, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Imodium Instant, 2 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 szt.

Kiedy nie stosować leku Imodium Instant:

jeśli pacjent ma uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, u dzieci w wieku poniżej 6 lat, jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania, w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Stosowanie leku Imodium Instant należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności.

Informacje dodatkowe Imodium Instant, 2 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 szt.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

bóle i zawroty głowy,
zatwardzenie, nudności, wzdęcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

bezsennaść,
ból i dolegliwości w obrębie brzucha, ból w nadbrzuszu,
suchość w jamie ustnej,
wymioty, niestrawność,
wysypka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
reakcja nadwrażliwości,
nieprawidłowa koordynacja, obniżony poziom świadomości, utrata świadomości,
senność, otępienie,
nieδροżność jelita,
rozszerzenie okrężnicy,
wysypka, świąd, pokrzywka,
zwężenie źrenicy,
zatrzymanie moczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leczenie biegunki lekiem jest jedynie leczeniem objawowym.

Dzieci są szczególnie wrażliwe na ryzyko odwodnienia i utraty elektrolitów - należy pamiętać o odpowiedniej podaży płynów.

W przypadku braku poprawy w ciągu 48 godzin w leczeniu biegunki ostrej, należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z AIDS, stosujący lek Imodium Instant z powodu biegunki, w razie pojawienia się najwcześniejszych objawów wzdęcia brzucha powinni natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów przyjmujących zbyt duże dawki loperamidu (substancji czynnej leku Imodium Instant) notowano występowanie ciężkich zaburzeń pracy serca (m.in. przyspieszony lub nieregularny rytm serca).

Pacjenci z zespołem jelita drażliwego, stosując lek powinni zwrócić uwagę na występujące nowe objawy, zmianę masy ciała, częstość i charakter występujących biegunek / zaparć.

Lek zawiera źródło fenylalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenylketonurią.

Lek Imodium Instant zawiera śladowe ilości siarczynów w kompozycji smakowo-zapachowej miętowej. Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Imodium Instant może wchodzić w interakcje z:

chinidyną,
desmopresyną,
ketokonazolem, itrakonazolem,
gemfibrozylem,
rytonawirem.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Podczas leczenia biegunek, należy pamiętać o zwiększonej podaży płynów.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Imodium Instant w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W przebiegu biegunki leczonej loperamidem mogą wystąpić zmęczenie, zawroty głowy lub senność, dlatego też należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Podmiot odpowiedzialny

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Hłżecka 24
02-135 Warszawa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.