


# Infacol, 40 mg/ml zawiesina doustna, 50 ml



Cena: 24,39 zł

## Opis słownikowy

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Postać            | syrop           |
| Producent         | Teva            |
| Rejestracja       | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Simetikon       |

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Infacol, 40 mg/ml zawiesina doustna, 50 ml

Infacol to produkt leczniczy do stosowania w bólach kolkowych i wzdęciach u niemowląt w wieku 1-6 miesięcy.

### Skład Infacol, 40 mg/ml zawiesina doustna, 50 ml

Substancją czynną jest: symetykon (Simeticonum).

1 ml zawiesiny zawiera 40 mg symetykonu.

Substancje pomocnicze: sacharyna sodowa, hypromeloza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa, woda oczyszczona.

### Działanie Infacol, 40 mg/ml zawiesina doustna, 50 ml

Infacol zawiera symetykon, który łagodzi dolegliwości związane z nadmiernym nagromadzeniem gazów w przewodzie pokarmowym. Symetykon zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu i ułatwia ich pękanie.

## Wskazania Infacol, 40 mg/ml zawiesina doustna, 50 ml

Łagodzenie dolegliwości bólowych (ból kolkowy, wzdęcia) związane z nadmiernym nagromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym w wyniku połykania powietrza (u niemowląt w wieku 1-6 miesięcy).

## Dawkowanie Infacol, 40 mg/ml zawiesina doustna, 50 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania doustnego.
- Przez użyciem należy dobrze wstrząsnąć butelką, a następnie całkowicie napełnić zakraplacz poprzez dwukrotne ściśnięcie jego gumowej końcówki. Należy pozwolić, aby nadmiar zawiesiny spłynął z powrotem do butelki.

**Niemowlęta w wieku od 1 do 6 miesięcy:** 0,5 ml zawiesiny (pełna zawartość zakraplacza, czyli 20 mg symetykonu) podawać przed każdym posiłkiem.

- W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 40 mg (1 ml zawiesiny).

## Przeciwwskazania Infacol, 40 mg/ml zawiesina doustna, 50 ml

Kiedy nie stosować leku Infacol:

w przypadku uczulenia na substancję czynną - symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,  
w przypadku zaburzeń tarczycy,  
jeśli występują zaparcia lub niedrożność jelit,  
u niemowląt poniżej 1. miesiąca życia.

## Informacje dodatkowe Infacol, 40 mg/ml zawiesina doustna, 50 ml

Jeśli dolegliwości nie ustępują po 7 dniach regularnego stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza.  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Infacol może wchodzić w interakcję z lewotyroksyną ograniczając jej wchłanianie i zmniejszyć skuteczność leczenia zaburzeń tarczycy.

### Stosowanie leku z jedzeniem i pićciem

Lek podawać przed posiłkiem.

### Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.