Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Intractum Visci Phytopharm, płyn doustny, 100 ml

Cena: 10,98 zł

Opis słownikowy

Postać	płyn
Producent	Phytopharm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Jemioła

Opis produktu

Informacje podstawowe Intractum Visci Phytopharm, płyn doustny, 100 ml

Intractum Visci Phytopharm to produkt leczniczy stosowany u osób zagrożonych nadciśnieniem tętniczym.

Skład Intractum Visci Phytopharm, płyn doustny, 100 ml

Substancja czynna: etanolowy wyciąg ze świeżego ziela jemioły.

100 ml płynu zawiera 100 ml etanolowego wyciągu ze świeżego ziela jemioły (Visci herbae recentis intractum) (1:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (v/v).

Zawartość etanolu w produkcie 52 - 62 % (v/v).

Wskazania Intractum Visci Phytopharm, płyn doustny, 100 ml

Intractum Visci Phytopharm jest stosowany tradycyjnie u osób zagrożonych nadciśnieniem tętniczym, u których lekarz zalecił zmianę trybu życia (jako uzupełnienie zaleceń lekarskich) i znajdujących się pod stałą kontrolą lekarza.

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Dawkowanie Intractum Visci Phytopharm, płyn doustny, 100 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: doustnie 3 razy dziennie po 2,5 ml leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody.

Zalecany czas kuracji to około 4 tygodnie.

Przeciwwskazania Intractum Visci Phytopharm, płyn doustny, 100 ml

Kiedy nie stosować leku Intractum Visci Phytopharm

w przypadku nadwrażliwości na ziele jemioły,
u osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym,
u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Informacje dodatkowe Intractum Visci Phytopharm, płyn doustny, 100 ml

Dawka jednorazowa (2,5 ml) zawiera do 1,25 g etanolu, co stanowi ok. 13 ml wina i 28 ml piwa.
Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową, chorobą wątroby i padaczką.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciaży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.