

InVag, kapsułki twarde dopochwowe, 14 szt.



Cena: 83,39 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------|
| Postać | kapsułki dopochwowe |
| Producent | Ibss Biomed |
| Przechowywanie | 2-8°C |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Probiotyki |

Opis produktu

Informacje podstawowe InVag, kapsułki twarde dopochwowe, 14 szt.

InVag to produkt leczniczy zawierający bakterie kwasu mlekowego, które przywracają równowagę pH pochwy do stosowania w zaburzeń mikroflory spowodowanej m.in. stosowaniem antybiotyków czy zmianami hormonalnymi.

Skład InVag, kapsułki twarde dopochwowe, 14 szt.

Substancje czynne: kwas mlekowy:

25% *Lactobacillus fermentum* 57A,

25% *Lactobacillus plantarum* 57B,

50% *Lactobacillus gasseri* 57C, w ilości nie mniej niż 10⁹ CFU* na kapsułkę.

*CFU - Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonie.

Substancje pomocnicze: odtuszczone mleko w proszku, sacharoza, sodu L-glutaminian, mannitol, laktoza jednowodona, magnezu stearynian; *składniki kapsułek:* elatyna, tytanu dwutlenek.

Działanie InVag, kapsułki twarde dopochwowe, 14 szt.

InVag zawiera bakterie kwasu mlekowego, które przywracają lub uzupełniają właściwą florę bakteryjną pochwy i kwasowość pH. Bakterie te mają zdolność kolonizacji nabłonka pochwy.

Wskazania InVag, kapsułki twarde dopochwowe, 14 szt.

Lek stosuje się w ramach uzupełnienia lub przywrócenia flory bakteryjnej pochwy, m.in. w:

ramach profilaktyki zapobiegania infekcji układu moczowo-płciowego (w trakcie i po leczeniu antybiotykami, lekami o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwrzęsistkowym, przeciwgrzybiczym) oraz w okresie po porożu i klimakterium, ramach profilaktyki, jeśli istnieje możliwość zaburzenia flory bakteryjnej, np. niewłaściwe przyzwyczajenia higieniczne, antykoncepcja, stanach zapalnych pochwy (zakażenia pochwy) jako leczenie wspomagające, w trakcie i po leczeniu antybiotykami, innymi lekami o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym.

Dawkowanie InVag, kapsułki twarde dopochwowe, 14 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania dopochwowego.

Należy stosować 1 kapsułkę na noc, przez tydzień. Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Przeciwwskazania InVag, kapsułki twarde dopochwowe, 14 szt.

Kiedy nie stosować leku InVag:

w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Informacje dodatkowe InVag, kapsułki twarde dopochwowe, 14 szt.

Należy zachować ostrożność w przypadku poważnych zaburzeń immunologicznych - przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Lek należy przechowywać w lodówce (2-8°C).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.