

Karpal Akut, maść na zespół cieśni kanału nadgarstka, 50 ml



Cena: 36,09 zł

Opis słownikowy

Postać	maść
Producent	Solinea
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Chmiel, Skrzyp polny, Świelik

Opis produktu

Informacje podstawowe Karpal Akut, maść na zespół cieśni kanału nadgarstka, 50 ml

Karpal Akut to wyrób medyczny w postaci maści do stosowania na skórę, który pomaga zmniejszyć dolegliwości bólowe i wspomaga czucie w palcach. Preparat przeznaczony jest do masażu w przypadku występowania zespołu cieśni kanału nadgarstka.

Skład Karpal Akut, maść na zespół cieśni kanału nadgarstka, 50 ml

Woda, etanol, olej z nasion konopi siewnych (*Cannabis sativa*), dimetykon, izostearynian glikolu propylenowego, etyloceluloza, laurynian glikolu propylenowego, ekstrakt przetacznika leżącego (*Veronica officinalis*), ekstrakt ze skrzypu polnego (*Equisetum arvense*), ekstrakt ze świelika rosyjskiego (*Euphrasia rostoviana*), ekstrakt z chmielu zwyczajnego (*Humulus lupulus*), trigliceryd kaprylowo-kaprynowy, kaprylan glicerolu, undecylenian glicerolu, glikol kaprylowy, etyloheksylogliceryna, mentol, karbomer, olejek z rozmarynu lekarskiego (*Rosmarinus officinalis*), krospolimer metakrylanu metylu, wodorotlenek sodu.

Działanie Karpal Akut, maść na zespół cieśni kanału nadgarstka, 50 ml

Działanie wyrobu wynika z połączenia masażu i składników zawartych w maści. Łagodzące ekstrakty z roślin zmniejszają dolegliwości bólowe dłoni i poprawiają czucie w palcach.

Wskazania Karpal Akut, maść na zespół cieśni kanału nadgarstka, 50 ml

Maść przeznaczona jest do stosowania miejscowego oraz do masażu okolic nadgarstka, dłoni i przedramienia.

Informacje dodatkowe Karpal Akut, maść na zespół cieśni kanału nadgarstka, 50 ml

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania wyrobu medycznego.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować na błony śluzowe, okolice oczu i piersi.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.