


## Ketonal Active, 50 mg kapsułki twarde, 30 szt.



Cena: 42,59 zł

### Opis słownikowy

Marka	Ketonal
Postać	kapsułki
Producent	Sandoz
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Ketoprofen

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Ketonal Active, 50 mg kapsułki twarde, 30 szt.

Ketonal Active to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Przeznaczony jest dla młodzieży powyżej 15 roku życia i dorosłych.

### Skład Ketonal Active, 50 mg kapsułki twarde, 30 szt.

Substancją czynną leku jest ketoprofen (Ketoprofenum).

Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu (Ketoprofenum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna. Skład kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), błękit patentowy (E 131).

### Działanie Ketonal Active, 50 mg kapsułki twarde, 30 szt.

Ketonal Active należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

## Wskazania Ketonal Active, 50 mg kapsułki twarde, 30 szt.

Produkt leczniczy Ketonal Active jest wskazany do objawowego leczenia ostrego bólu różnego pochodzenia o lekkim i umiarkowanym nasileniu, np. bóli miesiączkowych, mięśni, kości i stawów oraz głowy i zębów oraz bólu spowodowanego nadwyrężeniami i zwichnięciami.

## Dawkowanie Ketonal Active, 50 mg kapsułki twarde, 30 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę (co 8 godzin).

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Kapsułki należy przyjmować podczas posiłków, popijając co najmniej połową szklanki wody lub mleka. Można jednocześnie przyjmować leki zobojętniające sok żołądkowy, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka szkodliwego działania leku na przewód pokarmowy.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować produktu leczniczego dłużej niż przez 5 dni.

## Przeciwwskazania Ketonal Active, 50 mg kapsułki twarde, 30 szt.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą oraz u Pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nerek lub serca, skazą krwotoczną, czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, owrzodzeniem, perforacją lub krwawieniem przewodu pokarmowego.

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u Pacjentów, którzy mieli w przeszłości reakcję nadwrażliwości na inne leki z grupy NLPZ.

## Informacje dodatkowe Ketonal Active, 50 mg kapsułki twarde, 30 szt.

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia następujących działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego: obrzęk twarzy, warg lub gardła, powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu, ze świszczącym oddechem lub uciskiem w klatce piersiowej, szybkie bicie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi; napad astmy oskrzelowej; pieczenie, uporczywy ból żołądka; wymioty zawierające krew, silny ból brzucha lub smoliste stolce; powstawanie pęcherzy, złuszczenie się skóry lub krwawienie w obrębie skóry ze świądem, grudkowata wysypka (w obrębie warg, oczu, jamy ustnej, nosa, narządów płciowych, rąk lub stóp); obecność krwi w moczu, zmiany ilości wydalanego moczu, obrzęki nóg, kostek lub stóp.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób): zmiany laboratoryjnych wskaźników czynności wątroby (zwiększenie wyników testów czynności wątroby).

Działania niepożądane występujące często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób): złe samopoczucie, osłabienie organizmu (astenia); niestrawność, nudności, ból brzucha, wymioty.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować u mniej niż 1 na 100 osób): ból głowy, zawroty głowy, senność; zaparcie, biegunka, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka; reakcje alergiczne, wysypka, świąd; obrzęki (zatrzymanie wody).

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 osób): niedokrwistość spowodowana krwotokiem lub krwawieniem; drętwienie, mrowienie, kłucie lub pieczenie skóry (parestezje); zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie); szumy uszne; napad astmy oskrzelowej; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie żołądka; zapalenie wątroby; zwiększenie masy

ciała.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Należy zachować ostrożność u Pacjentów: ze schorzeniami przewodu pokarmowego, wątroby, nerek, niekontrolowanym nadciśnieniem, chorobami serca i naczyń, cukrzycą i palących tytoń oraz odwodnionych i w przebiegu zakażeń, w podeszłym wieku.

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

#### **Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

U niektórych pacjentów celowe może być stosowanie leków neutralizujących lub osłaniających błonę śluzową żołądka.

Następujących leków nie powinno się stosować razem z Ketonal Active: inne leki przeciwbólne, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwkrwotoczne, leki trombolityczne, lit, metotreksat.

Ketonal Active może wchodzić w interakcję z: lekami moczopędnymi, lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi, lekami stosowanymi w leczeniu depresji (SSRI), kortykosteroidami (stosowanymi np. w przypadku obrzęku, alergii), pentoksyfilią, probenecydem, lekami przeciwcukrzycowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, lekami stosowanymi w chorobach serca, anytbiotykami z grupy chinolonów, lekami immunosupresyjnymi.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

#### **Stosowanie leku z jedzeniem i pićciem**

Ketonal Active najlepiej przyjmować podczas posiłków.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ketonal Active nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Stosowanie w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią.

#### **Wpływ na płodność**

Ketonal Active może osłabiać płodność u kobiet i nie jest zalecany u kobiet, które planują ciążę.

#### **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży**

Leku Ketonal Active nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia.

#### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych w postaci senności, zawrotów głowy, zaburzeń widzenia lub drgawek nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.