


Klimadynon, 2,8 mg tabletki powlekane, 60 szt.



Cena: 39,39 zł

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Bionorica
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Pluskwica groniasta

Opis produktu

Informacje podstawowe Klimadynon, 2,8 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Klimadynon to roślinny produkt leczniczy w postaci tabletek stosowany w łagodzeniu dolegliwości menopauzalnych, takich jak obfite pocenie się i uderzenia gorąca.

Skład Klimadynon, 2,8 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Substancją czynną leku jest wyciąg z kłącza pluskwicy groniastej (*Cimicifuga racemosa*)

1 tabletkę powlekaną zawiera 2,8 mg suchego wyciągu kłącze pluskwicy groniastej (10:1), ekstrahent: etanol 58% (V/V).

Substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, Kopolimer amoniometakrylanowy, typ A, rozproszenie 30% (Eudragit RL 30D), Żelaza tlenek czerwony (E172), Żelaza tlenek żółty (E172), Laktoza jedno wodna, Makrogol 6000, Magnezu stearynian (roślinny), Skrobia ziemniaczana, Oczyszczony talk, Wodorotlenek sodu, Kwas sorbowy, Tytanu dwutlenek (E 171)

Działanie Klimadynon, 2,8 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Zmniejsza uciążliwe uderzenia gorąca, łagodzi zmiany nastroju.

Wskazania Klimadynon, 2,8 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Produkt leczniczy roślinny stosowany u dorosłych kobiet w łagodzeniu dolegliwości menopauzalnych takich jak uderzenia gorąca, wahania nastroju i obfite pocenie się.

Dawkowanie Klimadynon, 2,8 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Dorośli: zazwyczaj dawka dla dorosłych pacjentek w okresie menopauzy to po 1 tabletkę powlekaną 2 razy na dobę, rano i wieczorem (maksymalnie 2 tabletki powlekane dziennie). Tabletki powlekane należy popić płynem. Tabletek nie żuć i nie ssać.

Przeciwwskazania Klimadynon, 2,8 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; zaburzenia czynności wątroby; krwawienie z pochwy. Jeśli pacjentka była wcześniej leczona, lub jest obecnie leczona w związku z rakiem piersi lub innymi nowotworami zależnymi od hormonów. Jeśli pacjenta przyjmuje estrogeny. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Lek nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży. Lek nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią. Podczas występowania objawów menopauzalnych pacjentka nadal może zająć w ciążę i w związku z tym powinna stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Lek zawiera laktozę.

Informacje dodatkowe Klimadynon, 2,8 mg tabletki powlekane, 60 szt.

Należy skonsultować się z lekarzem:

jeśli u pacjentki występują zaburzenia czynności wątroby w wywiadzie.

jeśli u pacjentki pojawią się objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące uszkodzenie wątroby. Pacjentka powinna przerwać przyjmowanie leku Klimadynon i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

jeśli pojawi się krwawienie z pochwy lub wystąpią niejasne lub nowe objawy.

jeśli pacjentka była wcześniej leczona lub jest obecnie leczona w związku z rakiem piersi lub innymi nowotworami zależnymi od hormonów.

jeśli pacjentka przyjmuje estrogeny.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Klimadynon nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży. Podczas występowania objawów menopauzalnych pacjentka nadal może zająć w ciążę i w związku z tym powinna stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Nie wiadomo, czy substancja czynna przenika do mleka ludzkiego. Lek Klimadynon nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.