


# Korzeń prawoślazu, zioła do zaparzania, 50 g Kawon



Cena: 4,79 zł

## Opis słownikowy

Postać	zioła do zaparzania
Producent	ZAKŁ. ZIELARSKI "KAWON-HURT" NOWAK SP.J.
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Prawoślaz

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Korzeń prawoślazu, zioła do zaparzania, 50 g Kawon

Korzeń prawoślazu (*Althaea radix*) to produkt leczniczy w formie zioła do zaparzania, które stosuje się jako środek osłaniający błony śluzowe w kaszlu. Korzeń prawoślazu można podawać osobom dorosłym oraz dzieciom powyżej 12 roku życia.

### Skład Korzeń prawoślazu, zioła do zaparzania, 50 g Kawon

100 g produktu zawiera 100 g korzenia prawoślazu.

### Wskazania Korzeń prawoślazu, zioła do zaparzania, 50 g Kawon

Środek osłaniający błony śluzowe w kaszlu towarzyszącym przeziębieniu.

### Dawkowanie Korzeń prawoślazu, zioła do zaparzania, 50 g Kawon

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: Namoczyć 1 łyżkę (4,5 g) rozdrobnionego korzenia w 1 szklance (200 ml) letniej wody, pozostawić do namoczenia na 1-2 godziny. Następnie zagotować, pozostawić do ostygnięcia i odcedzić. Pić 2-3 razy dziennie po 1 szklance świeżo przygotowanego odwaru.

## Przeciwwskazania Korzeń prawoślazu, zioła do zaparzania, 50 g Kawon

Nadwrażliwość na korzeń prawoślazu.

Nie zaleca się stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią.

## Informacje dodatkowe Korzeń prawoślazu, zioła do zaparzania, 50 g Kawon

W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub odpluwania ropnej płwociny zasięgnąć porady lekarza. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku życia. Jeśli dolegliwości nasiliły się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

### Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

### Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn:

Brak danych

### Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, dlatego nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

### Interakcje:

Wchłanianie innych równocześnie przyjmowanych leków może być opóźnione

### Działania niepożądane:

Dotychczas brak doniesień. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i poinformować o nich lekarza.