Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Krople żołądkowe z papaveryna (Fortestomachicae), 35 g

Cena: 8,99 zł

Opis słownikowy

Marka	Herbapol
Postać	krople
Producent	Herbapol Kraków
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Dziurawiec, Mięta, Nalewka gorzka

Opis produktu

Skład Krople żołądkowe z papaveryna (Fortestomachicae), 35 g

100 g:
Valerianae tinctura (1:5) (nalewka kozłkowa)- 24,9 g, Menthae pip. tinctura (1:20) (nalewka miętowa)- 24,9 g, Amara tinctua (1:5) (nalewka gorzka)- 24,9 g, ex: Gentianae radice, Menyanthidis folio, Auranti amari pericarpio (60, 0 cz., 60,0 cz., 50,0 cz.), Hyperici tinctura (1:5) (nalewka z dziurawca)- 24,9 g, Papaverini hydrochloridum- 0,4 g. Produkt zawiera 67-74% obj. etanolu).

Działanie Krople żołądkowe z papaveryna (Fortestomachicae), 35 g

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania: w niestrawności doustnie jednorazowo ok. 2,5 ml, co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu w 1/4 szklanki wody lub na cukier, 30 min. przed jedzeniem w przypadku wystąpienia dolegliwości. W braku łaknienia ok 2,4 ml, co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu w 1/4 szklanki wody lub na cukier, 30 min. przed jedzeniem 3-4x dziennie do ustąpienia dolegliwości.

Wskazania Krople żołądkowe z papaveryna (Fortestomachicae), 35 g

Preparat tradycyjnie stosowany w niestrawności i braku łaknienia.

Dawkowanie Krople żołądkowe z papaveryna (Fortestomachicae), 35 g

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania: w niestrawności doustnie jednorazowo ok. 2,5ml, co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu w 1/4 szklanki wody lub na cukier, 30 min. przed jedzeniem w przypadku wystąpienia dolegliwości. W braku łaknienia ok. 2,5ml co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu na 1/4 szklanki wody lub na cukier, 30 min. przed jedzeniem 3-4 x dziennie do ustapienia dolegliwości.

Przeciwwskazania Krople żołądkowe z papaveryna (Fortestomachicae), 35 g

Nadkwaśność, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Nie podawać dzieciom do 12 roku życia oraz osobom cierpiącym na choroby wątroby, padaczke, alkoholizm.
Nie stosować w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Lek może powodować nadwrażliwość nad światło słoneczne szczególnie u osób o jasnej karnacji.

Informacje dodatkowe Krople żołądkowe z papaveryna (Fortestomachicae), 35 g

Preparat może wpływać na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu. Z tego względu preparatu nie należy stosować przed prowadzeniem pojazdu. Ponadto alkohol zawarty w produkcie może zostać wykryty w powietrzu wydychanym.