

Lactulosum Orifarm Forte, 667 mg/ml syrop, 150 ml

Cena: 19,39 zł



Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	ORIFARM
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Laktuloza

Opis produktu

Informacje podstawowe Lactulosum Orifarm Forte, 667 mg/ml syrop, 150 ml

Lek Lactulosum Orifarm Forte w postaci syropu o smaku truskawkowym ma działanie przeczyszczające i przeznaczony jest do leczenia zaparcí oraz w encefalopatii wątrobowej.

Skład Lactulosum Orifarm Forte, 667 mg/ml syrop, 150 ml

Substancj? czynn? leku jest laktuloza (*Lactulosum*).

1 ml syropu zawiera 667 mg laktulozy (w postaci laktulozy ciek?ej).

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona.

Działanie Lactulosum Orifarm Forte, 667 mg/ml syrop, 150 ml

Lek Lactulosum ma działanie przeczyszczające.

Wskazania Lactulosum Orifarm Forte, 667 mg/ml syrop, 150 ml

Wskazaniami do stosowania Lactulosum są przewlekłe zaparcia, encefalopatia wątrobowa.

Dawkowanie Lactulosum Orifarm Forte, 667 mg/ml syrop, 150 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież: dobową dawkę początkową (pierwsze trzy dni) 15-45 ml (10,0 - 30,0 g laktulozy). Dobowa dawka podtrzymująca: 15-30 ml (10,0 - 20,0 g laktulozy).

Dzieci (7-14 lat): dobową dawkę początkową (pierwsze trzy dni) 15-30 ml (10,0 - 20,0 g laktulozy). Dobowa dawka podtrzymująca: 10-15 ml (6,7 - 10,0 g laktulozy).

Dzieci (1-6 lat): dobową dawkę początkową (pierwsze trzy dni) 5-10 ml (3,3 - 6,7 g laktulozy). Dobowa dawka podtrzymująca 5-10 ml (3,3 - 6,7 g laktulozy).

Niemowlęta poniżej 1 roku: dawka początkowa (pierwsze trzy dni) 5-10 ml (3,3 - 6,7 g laktulozy). Dobowa dawka podtrzymująca do 5 ml (do 3,3 g laktulozy).

Lek należy podawać doustnie. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze, np. podczas śniadania.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

Przeciwwskazania Lactulosum Orifarm Forte, 667 mg/ml syrop, 150 ml

Nie należy stosować leku jeżeli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku oraz u osób z niedrożnością jelit, a także u osób z galaktozemią.

Informacje dodatkowe Lactulosum Orifarm Forte, 667 mg/ml syrop, 150 ml

Działania niepożądane

Jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszano działania niepożądane jako częstość nieznaną - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: reakcje alergiczne, wysypka, świąd, pokrzywka.

Podczas stosowania laktulozy jako leku przeczyszczającego w zaparciach obserwowano, zwłaszcza w początkowym okresie podawania, następujące działania niepożądane: Zaburzenia żołądka i jelit: łagodne, przemijające wzdęcia, bóle brzucha, niekiedy nudności.

Podczas stosowania laktulozy w dużych dawkach w encefalopatii wątrobowej obserwowano następujące działania niepożądane: Zaburzenia żołądka i jelit: wzdęcia, bóle brzucha, nudności, biegunki; pojedyncze przypadki odmy pęcherzykowej jelit. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: obniżenie stężenia potasu w osoczu krwi poniżej normy (hipokaliemia); zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi powyżej normy (hipernatremia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na: bóle brzucha o nieustalonej przyczynie; zespół żołądkowo-sercowy tzn. zespół Roemhelda (choroba w trakcie której nagromadzony gaz w przewodzie pokarmowym lub zaburzenia normalnego pasażu treści żołądkowej wywołują objawy sercowe); cukrzycę.

Lactulosum Orifarm Forte zawiera fruktozę, galaktozę, laktozę, sodu benzoesan.

Lek należy przechować w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25oC. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 28 dni.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Działanie niektórych leków może ulec zmianie, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem Lactulosum Orifarm Forte, np: leki zobojętniające kwas solny; doustne leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol, fenpropakumon); droperidol – zwiększa ryzyko wywołania przez laktulozę obniżenia stężenia potasu i magnezu w osoczu krwi poniżej normy (hipokaliemia, hipomagnezemia) oraz nasila ryzyko działania uszkadzającego mięsień sercowy (działanie kardi toksyczne); z korzeniem lukrecji – zwiększa ryzyko hipokaliemii.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićm

Lek może być podawany z wodą, sokami owocowymi lub mlekiem.

W trakcie stosowania leku należy przyjmować większą ilość płynów.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.