

Lakcid, liofilizat do sporządzania zawiesin doustnych, 10 szt.

Cena: 34,79 zł



Opis słownikowy

Marka	Lakcid
Postać	proszek
Producent	Biomed
Przechowywanie	2-8°C
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Probiotyki

Opis produktu

Informacje podstawowe Lakcid, liofilizat do sporządzania zawiesin doustnych, 10 szt.

Lakcid to produkt leczniczy w postaci liofilizatu bakterii probiotycznych do sporządzania zawiesiny doustnej. Szczepy obecnych w leku bakterii kolonizują śluzówkę jelit i wzbogacają skład mikroflory jelitowej, szczególnie po wyjąławiającej antybiotykoterapii. Ograniczają rozwój chorobotwórczych mikroorganizmów.

Skład Lakcid, liofilizat do sporządzania zawiesin doustnych, 10 szt.

Składnikiem czynnym leku są pałeczki *Lactobacillus rhamnosus*

Jedna ampulka zawiera minimum 2 mld jednostek formujących kolonie bakterii

Szczep *Lactobacillus rhamnosus* Pen - 40 %

Szczep *Lactobacillus rhamnosus* E/N - 40 %

Szczep *Lactobacillus rhamnosus* Oxy - 20 %

Pałeczki odporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycylinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy,

meropenem, metronidazol, neomycyn?, netylmycyn?, penicylin?, piperacylin?, streptomycyn?, teikoplanin?, tobramycyn?, wankomycyn?.

Substancje pomocnicze: mleko odtuszczone i sacharoza.

Działanie Lakcid, liofilizat do sporządzania zawiesin doustnych, 10 szt.

Lek **Lakcid** zawiera pałeczki *Lactobacillus rhamnosus*. Podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego kolonizują i normalizują skład mikroflory przewodu pokarmowego. Przeżywa w środowisku soku żołądkowego, są odporne na działanie soli kwasów organicznych oraz szerokiego spektrum antybiotyków stosowanych klinicznie.

Wytwarzają niekorzystne warunki do rozwoju wirusów i chorobotwórczych mikroorganizmów.

Wskazania Lakcid, liofilizat do sporządzania zawiesin doustnych, 10 szt.

Lek Lakcid przeznaczony jest do stosowania:

w poantybiotycznym zapaleniu jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy, w zapobieganiu biegunce podróży, jako leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.

Dawkowanie Lakcid, liofilizat do sporządzania zawiesin doustnych, 10 szt.

Lek podaje się doustnie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, 3 - 4 razy dziennie jedna ampułka.

Bezpośrednio przed użyciem ampułkę otworzyć poprzez ostrożne naciśnięcie szyjki ampułki ku dołowi. Punkt nacisku ampułki jest oznaczony „kropką”. Dodać niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze wymieszać. Krawędzią otwartej ampułki dotknąć do ścianki łyżeczki. Na łyżeczkę wypłynie zawiesina.

Przeciwwskazania Lakcid, liofilizat do sporządzania zawiesin doustnych, 10 szt.

Kiedy nie stosować leku Lakcid:

Nie stosować leku jeśli stwierdzono nadwrażliwość na białko mleka krowiego.

Informacje dodatkowe Lakcid, liofilizat do sporządzania zawiesin doustnych, 10 szt.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W obowiązującym okresie ważności, lek może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C - 25°C.

MEDEST

BO TWOJE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48