

Lipancrea, 8000 j. lipazy kapsułki, 20 szt.



Cena: 27,39 zł

Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Polfa Warszawa

Opis produktu

Informacje podstawowe Lipancrea, 8000 j. lipazy kapsułki, 20 szt.

Wyciąg enzymów trzustkowych pochodzenia zwierzęcego. Zawiera lipazę - hydrolizującą tłuszcze, amylazę - rozkładającą skrobię oraz proteazy powodujące rozpad białka. Każda kapsułka preparatu zawiera peletki powlekane otoczką oporną na działanie soku żołądkowego, dzięki temu ich zawartość zostaje uwolniona dopiero w dwunastnicy, gdzie wydzielany jest sok trzustkowy. Enzymy zawarte w preparacie nie podlegają procesowi wchłaniania i eliminacji.

Skład Lipancrea, 8000 j. lipazy kapsułki, 20 szt.

Składniki w 1 kapsułce: 1 kaps. Lipancrea 8 000 zawiera 8 000 j. Ph. Eur. lipazy, 5 750 j. Ph. Eur. amylazy oraz 450 j. Ph. Eur. proteaz. 1 kaps. Lipancrea 16 000 zawiera 16 000 j. Ph. Eur. lipazy, 11 500 j. Ph. Eur. amylazy oraz 900 j. Ph. Eur. proteaz.

Wskazania Lipancrea, 8000 j. lipazy kapsułki, 20 szt.

Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją trzustki bądź jej części, resekcją żołądka, zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową, mukowiscydozą.

Dawkowanie Lipancrea, 8000 j. lipazy kapsułki, 20 szt.

Dorośli: Zazwyczaj 2-4 kapsułki Lipancrea 8 000 lub 1-2 kapsułki Lipancrea 16 000 do każdego posiłku. Ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać, kontrolując objawy kliniczne. Nie należy stosować dawki większej niż 100 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek lub 400 000 j. Ph. Eur. na dobę w dawkach podzielonych.

Dzieci: Zalecane dawki enzymów: od 500 do 1000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek.
Nie należy stosować dawki większej niż 2500 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek, czyli 10 000 j. Ph. Eur. lipazy na kg mc. na dobę w dawkach podzielonych

Preparat przyjmować podczas posiłku popijając płynem (nie mlekiem). Kapsułki połykać w całości.

Informacje dodatkowe Lipancrea, 8000 j. lipazy kapsułki, 20 szt.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w zamkniętym opakowaniu, niedostępnym dla małych dzieci. Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.