

## Lipomal, 97 mg/5 ml syrop, 125 g



Cena: 22,49 zł

### Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	Aflofarm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Lipa

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Lipomal, 97 mg/5 ml syrop, 125 g

Lipomal to produkt leczniczy zawierający wyciąg z lipy, który jest tradycyjnym środkiem napotnym do stosowania w gorączce, stanach zapalnych gardła i kaszlu.

### Skład Lipomal, 97 mg/5 ml syrop, 125 g

**Substancj? czynn? jest:** suchy wyci?g z kwiatostanu lipy (*Tiliae inflorescentiae extractum siccum*).

5 ml syropu zawiera 97,089 mg wyci?gu z *Tilia cordata* Millet, *Tilia platyphyllos* Scop., *Tilia vulgaris* Heyne lub ich mieszaniny, inflorescentia (kwiatostan lipy) (6-7:1), w tym 85% wyci?gu natywnego. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 40% V/V.

**Substancje pomocnicze:** maltodekstryna, sacharoza, benzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy, guma ksantanowa, aromat malinowy AR0320, woda oczyszczona.

### Działanie Lipomal, 97 mg/5 ml syrop, 125 g

Lipomal zawiera kwiatostan lipy, który jest środkiem napotnym.

### Wskazania Lipomal, 97 mg/5 ml syrop, 125 g

stany gorączkowe,  
leczenie pomocnicze w przeziębieniu, stanach zapalnych gardła, kaszlu.

### Dawkowanie Lipomal, 97 mg/5 ml syrop, 125 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania doustnego.
- Do opakowania dołączona jest miarka.

Wiek pacjenta	Dawkowanie
Dzieci powyżej 1 roku życia do 3 lat	2-3 razy na dobę po 1 łyżeczce syropu (5 ml)
Dzieci powyżej 3 lat do 12 lat	4-5 razy na dobę po 1 łyżeczce syropu (5 ml)
Młodzież powyżej 12 lat i dorośli	3-4 razy na dobę po 1 łyżce syropu (10 ml)

### Przeciwwskazania Lipomal, 97 mg/5 ml syrop, 125 g

Kiedy nie stosować leku Lipomal:

w przypadku uczulenia na kwiatostan lipy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Informacje dodatkowe Lipomal, 97 mg/5 ml syrop, 125 g

#### Działania niepożądane

Brak danych na temat działań niepożądanych.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli gorączka nie ustępuje po 3 dniach lub przekracza 39°C, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem jeśli wystąpi duszność lub pojawi się ropna wydzielina.

Lek zawiera sacharozę - 5 ml zawiera 4 g sacharozy; w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów, stosowanie leku omówić z lekarzem.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Nie zamrażać.

Dopuszczalny jest osad na dnie butelki, wynikający z zawartości składnika naturalnego.

#### **Stosowanie innych leków**

Nie są znane interakcje Lipomalu z innymi lekami.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

#### **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży**

Lek można stosować u dzieci, które ukończyły 1 rok życia.

W przypadku wątpliwości oraz u dzieci w wieku 1-3 lat przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.