

Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg tabletki powlekane, 100 szt

Cena: 46,59 zł



Opis słownikowy

Marka	Magne B6
Postać	tabletki
Producent	Sanofi Aventis
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Magnez, Witamina B6

Opis produktu

Informacje podstawowe Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg tabletki powlekane, 100 szt

Magne B6 Forte zawiera jony magnezowe oraz chlorowoderek pirydoksyny (witaminę B6). Lek uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie. Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów.

Skład Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg tabletki powlekane, 100 szt

1 tabletki powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu

(Magnesii citras) oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodoru (Pyridoxini hydrochloridum)

Substancja pomocnicza: laktoza 50,57 mg

Działanie Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg tabletki powlekane, 100 szt

Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym stopień wchłaniania zależy od jego zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

Wskazania Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg tabletki powlekane, 100 szt

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

-nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;

-objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);

-kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6 forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Dawkowanie Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg tabletki powlekane, 100 szt

Tabletki należy połykać popijając dużą ilością wody

Dorośli:

3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.

Dzieci:

w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała ok. 20 kg):

10 do 30 mg/kg m.c. na dobę (tzn. 0,4 do 1,2 mmol/kg m.c. na dobę) tzn. 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Przeciwwskazania Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg tabletki powlekane, 100 szt

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min). - Jednoczesne stosowanie lewodopy

Informacje dodatkowe Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg tabletki powlekane, 100 szt

W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu.

W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od dożylnego podawania magnezu.

Produkt leczniczy Magne B6 forte zawiera laktozę i dlatego jest przeciwwskazany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy – galaktozy.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy, a nawet lat) może spowodować aksonalną neuropatię czuciową. Objawy obejmują:

drętwienie i zaburzenia poczucia pozycji, wibracje w dystalnych częściach kończyn, a także stopniowo postępującą ataksję sensoryczną (zaburzenia koordynacji). W większości przypadków objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.