

## Magnez + Witamina B6 Forte, kapsułki, 30 szt. APTEO

Cena: 9,29 zł



### Opis słownikowy

Marka	APTEO
Postać	kapsułki
Producent	Synoptis Pharma
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	Magnez, Witamina B6

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Magnez + Witamina B6 Forte, kapsułki, 30 szt. APTEO

Składniki preparatu Magnez + Witamina B6 Forte APTEO wpływają korzystnie na:

zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (magnez, witamina B6);  
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (magnez, witamina B6) i mięśni (magnez);  
zachowanie równowagi elektrolitowej (magnez);  
utrzymanie zdrowych kości i zębów (magnez).

## Skład Magnez + Witamina B6 Forte, kapsułki, 30 szt. APTEO

sole magnezowe kwasu cytrynowego -cytrynian magnezu (magnez); żelatyna; maltodekstryna; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: węglan wapnia; skrobia modyfikowana; chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Możliwa obecność: zbóż zawierających gluten; soi; mleka i produktów pochodnych (łącznie z laktozą).

\*%RWS - R(eferencyjna Warto?? Spo?ycia)sole magnezowe kwasu cytrynowego -cytrynian magnezu

(magnez); żelatyna; maltodekstryna; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: węglan wapnia; skrobia modyfikowana; chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Możliwa obecność: zbóż zawierających gluten; soi; mleka i produktów pochodnych (łącznie z laktozą).

## Dawkowanie Magnez + Witamina B6 Forte, kapsułki, 30 szt. APTEO

1 kapsułka dziennie, popijając wodą.

## Informacje dodatkowe Magnez + Witamina B6 Forte, kapsułki, 30 szt. APTEO

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.