


## Mastodynon, tabletki, 120 szt.

Cena: 137,89 zł



### Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Bionorica
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Homeopatyczny produkt leczniczy

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Mastodynon, tabletki, 120 szt.

Mastodynon jest homeopatycznym produktem leczniczym stosowanym wspomagająco w zespole napięcia przedmiesiączkowego.

## Skład Mastodynon, tabletki, 120 szt.

1 tabletki zawiera następujące substancje czynne:

<i>Vitex agnus- castus</i> TM	162,0 mg
<i>Caulophyllum thalictroides</i> D4	81,0 mg
<i>Cyclamen purpurascens</i> D4	81,0 mg
<i>Strychnos ignatii</i> D6	81,0 mg
<i>Iris versicolor</i> D2	162,0 mg
<i>Lilium lancifolium</i> D3	81,0 mg

**Substancje pomocnicze:** laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

## Działanie Mastodynon, tabletki, 120 szt.

Mastodynon to niehormonalny lek pochodzenia naturalnego o unikalnym składzie. Szerokie spektrum działania preparatu wynika z unikalnej kompozycji ekstraktów z niepokalanka, cyklamenu, lilii tygrysiej, kulczyby, kosaćca oraz blue cohosh. Mastodynon jest lekiem homeopatycznym.

## Wskazania Mastodynon, tabletki, 120 szt.

Mastodynon jest wskazany do stosowania u dorosłych kobiet w celu łagodzenia objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego takich jak:

mastodynia (bolesność piersi),  
zaburzenia równowagi emocjonalnej,

po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

## Dawkowanie Mastodynon, tabletki, 120 szt.

Lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka dla dorosłych kobiet to 1 tabletki dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

Lek Mastodynon należy przyjmować przez co najmniej 2-3 miesiące - także w trakcie menstruacji. Jeśli po 6 tygodniach przyjmowania produktu leczniczego dolegliwości będą się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli objawy powrócą po zakończeniu terapii należy skontaktować się z lekarzem.

## Przeciwwskazania Mastodynon, tabletki, 120 szt.

Kiedy nie stosować leku homeopatycznego Mastodynon:

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

## Informacje dodatkowe Mastodynon, tabletki, 120 szt.

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Mastodynon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane (częstotliwość występowania nie została sklasyfikowana):  
ciężkie reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy, dusznością i zaburzeniami połykania,  
alergiczne reakcje skórne,  
ból głowy, zawroty głowy,  
zaburzenia żołądkowo-jelitowe,  
zaburzenia miesiączkowania.

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Mastodynon zawiera laktozę.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Jedna tabletki Mastodynon zawiera średnio 0,3 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Tabletki Mastodynon nie zawierają glutenu.

Przyjmowanie leku należy skonsultować z lekarzem:

jeśli pacjentka choruje lub chorowała na estrogenozależnego raka,

jeśli pacjentka stosuje leki mające wpływ na wydzielanie dopaminy (hormon współczulnego układu nerwowego) lub stosuje terapię hormonalną,

jeśli pacjentka w przeszłości cierpiała na zaburzenia przysadki mózgowej.

### **Stosowanie innych leków**

Ze względu na możliwe działanie dopaminergiczne i estrogenne owoców *Vitex agnus-castus* nie można wykluczyć interakcji z agonistami i antagonistami dopaminy oraz estrogenami i antyestrogenami

### **Ciąża i karmienie piersią**

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Brak wskazań dotyczących stosowania leku w ciąży.

Dane z badań nad rozrodznością sugerują, że ekstrakt z owoców *Vitex agnus-castus* może mieć wpływ na laktację. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

### **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży**

Z powodu braku odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci, nie należy go stosować u pacjentek w wieku poniżej 18 lat.