

Melisana Klosterfrau, płyn doustny, 235 ml

Cena: 26,89 pln



Opis słownikowy

Producent	KLOSTERFRAU
Rejestracja	Lek ziołowy

Opis produktu

Opis

Opis

Melisana Klosterfrau jest wieloskładnikowym roślinnym produktem leczniczym, tradycyjnie stosowanym w stanach złego samopoczucia towarzyszącym różnorodnym dolegliwościom.

Skład

100 ml zawiera olejki eteryczne wydestylowane z alkoholem z 4,04 g mieszanki: liści melisy 10,48%, kłączy omanu 13,96%, korzenia arcydzięgla 134,96%, kłączy imbiru 13,96%, kwiatów goździka 5,57%, kłączy galangi 5,57% owoców pieprzu czarnego 1,39%, korzenia goryczki 13,69%, owocni pomarańczy 13,96%, kory cynamonowca 6,28%, kwiatów strączyńca 0,7%, owoców kardamonu 0,2%, 100 ml zawiera 62 mg olejków lotnych z wymienionych surowców w 66,8% (V/V) etanolu

Dawkowanie

Stosowanie doustne:

Tradycyjnie stosuje się zazwyczaj: 1 do 3 łyżeczek preparatu rozcieńczone co najmniej podwójną ilością wody lub innego płynu, względnie bez rozcieńczania podane na kostkę cukru.

Stosowanie zewnętrzne:

Należy wcierać preparat w bolące miejsca. Przy stosowaniu na wrażliwe partie skóry lub też użycie w formie okładu, lek można rozcieńczyć dwoma częściami wody.

Wskazania

Preparat stosowany wewnętrznie pomocniczo w dolegliwościach nerwicowych, stanach napięcia fizycznego i psychicznego, zaburzeniach snu, a także w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych na tle nerwowym, wzdęciach, braku apetytu. Zewnętrznie używany jest w bólach nerwowych, w bólach mięśniowych, w zapaleniu dziąseł.

Przeciwwskazania

Nie stosować w chorobie wrzodowej żołądka i jelit. Lek zawiera 66% objętościowych alkoholu etylowego. Stosując lek wg. zaleconego dawkowania pacjent przyjmuje w każdym 3 łyżeczkach do 7,8g alkoholu.

Preparat nie powinien być stosowany u:

- dzieci
- pacjentów cierpiących na schorzenia wątroby
- kobiet ciężarnych i karmiących piersią
- osób z chorobą alkoholową
- osób po urazach mózgu
- pacjentów cierpiących na padaczkę

Działania niepożądane

Preparat może zaburzyć bezpieczne prowadzenie pojazdów mechanicznych. Ze względu na zawartość alkoholu etylowego działanie leków przyjmowanych równolegle może być nasilone lub upośledzone.