

Mensil, 25 mg tabletki na erekcję do rozgryzania i żucia, 2 szt.



Cena: 27,49 zł

Opis słownikowy

Marka	Mensil
Postać	tabletki
Producent	Hasco-Lek S.A. ul. Żmigrodzka 242E 51-131 Wrocław
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Sildenafil

Opis produktu

Informacje podstawowe Mensil, 25 mg tabletki na erekcję do rozgryzania i żucia, 2 szt.

Mensil to produkt leczniczy stosowany w leczeniu zaburzeń wzrodu u dorosłych mężczyzn.

Skład Mensil, 25 mg tabletki na erekcję do rozgryzania i żucia, 2 szt.

Substancją czynną leku jest syldenafil (Sildenafilum).

Jedna tabletkę leku zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Substancje pomocnicze to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Działanie Mensil, 25 mg tabletki na erekcję do rozgryzania i żucia, 2 szt.

Mensil zawiera substancję czynną syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Wskazania Mensil, 25 mg tabletki na erekcję do rozgryzania i żucia, 2 szt.

Produkt leczniczy Mensil jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prząca wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

W celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna.

Dawkowanie Mensil, 25 mg tabletki na erekcję do rozgryzania i żucia, 2 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka leku Mensil to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.

- Leku Mensil nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
- Lek Mensil należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
- Tabletkę należy rozgryźć i żuć.
- Tabletki nie wymagają popijania.

Przeciwwskazania Mensil, 25 mg tabletki na erekcję do rozgryzania i żucia, 2 szt.

Kiedy nie stosować leku **Mensil**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przyjmuje azotany lub leki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi,
- w przypadku ciężkich chorób serca lub wątroby,
- po niedawno przebyłym udarze lub zawale serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

Informacje dodatkowe Mensil, 25 mg tabletki na erekcję do rozgryzania i żucia, 2 szt.

Lek zawiera aspartam oraz laktozę.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim wystąpią bóle w klatce piersiowej:

- należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,
- zasięgnąć pomocy medycznej.

Nie należy przyjmować leku Mensil razem z innymi lekami zawierającymi syldenafil.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

PPF Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242E
51-131 Wrocław
hasco@hasco-lek.pl

Galeria

MENSIL®



ZAWIERA SYLDENAFIL,
który umożliwia osiągnięcie erekcji
do 5 godzin od zażycia*

*Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Mensil - pl. 5, 04/15

MENSIL®
— DYSKRETNA POSTAĆ —
Tabletki do rozgryzania i żucia

-  **Nie wymaga popijania***
-  **Rozpuszcza się w ustach***
-  **O miętowym smaku**

*Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Mensil - pl. 5, 04/15

DAWKOWANIE

Zalecana dawka to 25 mg syldenafilu przyjmowane około godzinę przed aktywnością seksualną.

25mg



MENSIL®
25 mg
sylденаfilu w postaci tabletek do rozgryzania i żucia
8 tabletek

Na erekcję
Działanie w 1 godzinie
Działanie nawet po 12 minutach

Tabletki nie wymagają popijania

- powyżej 18. roku życia
- dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji
- dostępny bez recepty

Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Mensil - pl. 5, 04/15

Mensil wspomaga uzyskanie i utrzymanie erekcji



MENSIL®
25 mg
sylденаfilu w postaci tabletek do rozgryzania i żucia
8 tabletek

Na erekcję
Działanie w 1 godzinie
Działanie nawet po 12 minutach

Tabletki nie wymagają popijania

**dostępny w trzech opakowaniach:
2, 4 lub 8 tabletek**

Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Mensil - pl. 5, 04/15