


# Miconal 3,29 mg/g aerozol na skórę zawiesina, 39,5 g



Cena: 23,29 zł

## Opis słownikowy

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Postać            | aerozol         |
| Producent         | Polfa Tarchomin |
| Rejestracja       | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Mikonazol       |

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Miconal 3,29 mg/g aerozol na skórę zawiesina, 39,5 g

Miconal to aerozol przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę. Dzięki swojej substancji czynnej lek działa na wiele rodzajów grzybów oraz niektóre bakterie. Postać aerozolu ułatwia stosowanie leku w przypadku grzybicy w trudno dostępnych miejscach.

### Skład Miconal 3,29 mg/g aerozol na skórę zawiesina, 39,5 g

Substancja czynna jest mikonazolu azotanu (*Miconazoli nitras*).

1 g zawiesiny zawiera 3,29 mg mikonazolu azotanu.

Substancje pomocnicze: sorbitanu trioleinian (Span 85), lecytyna, izopropylu mirystynian, Drivosol 35 A (mieszanka propanu, butanu, izobutanu).

### Działanie Miconal 3,29 mg/g aerozol na skórę zawiesina, 39,5 g

Substancja czynna leku Miconal - miconazol zwalcza wiele rodzajów grzybów. Wykazuje również działanie przeciwbakteryjne na niektóre bakterie.

Wskazania Miconal 3,29 mg/g aerozol na skórę zawiesina, 39,5 g

**Miconal** jest stosowany miejscowo:

- w grzybiczych zakażeniach skóry (grzybica dłoni, stóp i między palcami, pach, pachwin),
- w zakażeniach mieszanych grzybiczo-bakteryjnych.

Dawkowanie Miconal 3,29 mg/g aerozol na skórę zawiesina, 39,5 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego. O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

- Przed każdym użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.
- Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie powinno być jeszcze kontynuowane przez co najmniej 1 tydzień.
- Zbyt częste stosowanie leku może powodować podrażnienie skóry, które ustępuje zwykle po zaprzestaniu stosowania leku.

Przeciwwskazania Miconal 3,29 mg/g aerozol na skórę zawiesina, 39,5 g

Kiedy nie stosować leku **Miconal**:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na miconazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Leku nie należy stosować w leczeniu zakażeń grzybiczych owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranionej skórze.

Informacje dodatkowe Miconal 3,29 mg/g aerozol na skórę zawiesina, 39,5 g

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, Miconal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane po stosowaniu aerozolu Miconal pojawiają się bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000). Są to:

pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze, podrażnienie skóry w miejscu stosowania aerozolu.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli kiedykolwiek w przeszłości wystąpiło uczulenie na mikonazol lub inny lek przeciwgrzybiczy, przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Miconal w postaci aerozolu przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego na skórę

Należy chronić oczy przed rozpylaną substancją. W razie przedostania się zawiesiny do oczu, należy je dokładnie przemyć letnią wodą. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Skrajnie łatwopalny aerozol.

### Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Pacjenci przyjmujący doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) muszą zachować ostrożność.

Działanie i objawy niepożądane niektórych innych leków (np. doustnych leków przeciwcukrzycowych i fenytoiny – lek o działaniu przeciwdrgawkowym i przeciwartmicyzm), w przypadku ich jednoczesnego stosowania z lekiem Miconal mogą się nasilić.

### Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### Producent

POLFA TARCHOMIN  
A. Fleminga 2  
Warszawa

## Galeria

