


Mucopect Kids, 50 mg/ml syrop, 200 ml



Cena: 16,88 zł

Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	Adamed
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Karbocysteina

Opis produktu

Informacje podstawowe Mucopect Kids, 50 mg/ml syrop, 200 ml

Lek Mucopect Kids zawiera substancję leczniczą o nazwie karbocysteina. Należy ona do grupy substancji zwanych „mukolitykami”, stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wydzielaniem śluzu w oskrzelach. Karbocysteina powoduje zmniejszenie lepkości śluzu (flegmy), dzięki czemu łatwiej usuwany jest z dróg oddechowych podczas kaszlu. Lek Mucopect Kids jest stosowany w objawowym leczeniu chorób dróg oddechowych, przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Jeśli po upływie 4 do 5 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Skład Mucopect Kids, 50 mg/ml syrop, 200 ml

Substancja czynna: jest karbocysteina. 1 mL syropu zawiera 50 mg karbocysteiny.
Pozostałe składniki: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), karmel (E 150d), sacharoza, aromat agrestowy „Aroma grosella 63 2334” (glikol propylenowy, mrówczan etylu, octan izopentylu, 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, 3-metylobutan-1-ol, gruszlina karbolistny (Barosma betulina) ekstrakt, kwas octowy, 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one), sodu wodorotlenek i woda oczyszczona.

Dawkowanie Mucopect Kids, 50 mg/ml syrop, 200 ml

Zazwyczaj lek stosuje się następująco:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Dawka dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to: 15 mL syropu trzy razy na dobę.

Po złagodzeniu objawów, dawkę należy zmniejszyć do 10 mL syropu trzy razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mL syropu trzy razy na dobę.

Po przyjęciu dawki syropu należy dokładnie zamknąć butelkę.

Nie należy stosować leku przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.

Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.

Przeciwwskazania Mucopect Kids, 50 mg/ml syrop, 200 ml

Leku Mucopect Kids nie należy stosować:

jeśli pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

jeśli pacjent ma wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy.

Informacje dodatkowe Mucopect Kids, 50 mg/ml syrop, 200 ml

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mucopect Kids należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

– u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa.

– pacjent ma ostrą niewydolność oddechową.

– pacjent jest osłabiony. Osłabienie odruchu kaszlowego wiąże się z ryzykiem niedrożności dróg oddechowych wskutek wzrostu ilości wydzieliny.

Leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, dlatego pacjenci, u których występowała w przeszłości choroba wrzodowa powinni stosować je z dużą ostrożnością.

W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u

pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.

Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.

Nie należy zażywać leku przed snem.