

## Multi-Sanostol, syrop, 300 g

Cena: 14,98 zł



### Opis słownikowy

Marka	Sanostol
Postać	syrop
Producent	Takeda Pharma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Multiwitamina

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Multi-Sanostol, syrop, 300 g

Multi-Sanostol jest lekiem wielowitaminowym w postaci syropu. W swoim składzie zawiera zarówno witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy A, D3, E), jak i w wodzie (witaminy B1, B2, B6, C, PP, dekspantenol) oraz dodatkowo wapń.

### Skład Multi-Sanostol, syrop, 300 g

Substancjami czynnymi leku są: witamina A, witamina D3, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina C, witamina E, witamina PP, dekspantenol, wapnia glukonian, wapnia fosforomleczan.

### 10 ml zawiera:

Witamina A - retynolu palmitynian	2400 j.m.
Witamina D3 - cholekalcyferol	200 j.m.
Witamina B1- tiaminy chlorowodorek	2 mg
Witamina B2 - ryboflawiny sodu	2 mg

fosforan	
Witamina B6 - pirydoksyny chlorowodorek	1 mg
Witamina C - kwas askorbowy	100 mg
Witamina E - all-rac-alfa-tokoferolu octan	2 mg
Witamina PP - nikotynamid	10 mg
Deksapantenol	4 mg
Wapnia glukonian	50 mg
Wapnia fosforomleczan	50 mg

Pozostałe składniki to: sacharoza, syrop glukozowy, kwas cytrynowy bezwodny, agar, tragakanta, ekstrakt słodowy, olejek pomarańczowy, koncentrat soku grejpfrutowego, koncentrat soku pomarańczowego, sodu benzoesan, kwas sorbowy, wapnia sacharynian czterowodny, polisorbitat 80, olej słonecznikowy, all-rac- $\alpha$ -tokoferol, woda oczyszczona.

## Działanie Multi-Sanostol, syrop, 300 g

Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Codzienna dieta jest często zbyt uboga i nie jest w stanie pokryć dziennego zapotrzebowania na witaminy.

## Wskazania Multi-Sanostol, syrop, 300 g

Lek Multi-Sanostol stosowany jest:

w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy;  
w utracie apetytu;  
w skłonnościach do częstych infekcji;  
w okresie wzrostu i rozwoju;  
w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczeniu;  
w obniżonej zdolności koncentracji;  
w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii;  
w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Lek Multi-Sanostol może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym.

## Dawkowanie Multi-Sanostol, syrop, 300 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Dzieci w wieku 1 do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml syropu.

Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.

## Przeciwwskazania Multi-Sanostol, syrop, 300 g

Kiedy nie stosować leku Multi-Sanostol:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;  
jeśli u pacjenta występują rzadkie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy;  
jeśli u pacjenta występują zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria);  
jeśli u pacjenta występują zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D).

## Informacje dodatkowe Multi-Sanostol, syrop, 300 g

Lek Multi-Sanostol zawiera: sacharozę, syrop glukozowy, sodu benzoesan, kwas sorbowy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.  
10 ml leku Multi-Sanostol zawiera 6,55 g sacharozy i 1,31 g glukozy, co jest równoważne około 0,66 jednostki węglowodanowej. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C