

Multi-Sanostol, syrop, 600 g

Cena: 24,93 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------|
| Marka | Sanostol |
| Postać | syrop |
| Producent | Takeda Pharma |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Multiwitamina |

Opis produktu

Informacje podstawowe Multi-Sanostol, syrop, 600 g

Multi-Sanostol jest lekiem wielowitaminowym w postaci syropu. W swoim składzie zawiera zarówno witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy A, D3, E), jak i w wodzie (witaminy B1, B2, B6, C, PP, dekspantenol) oraz dodatkowo wapń.

Skład Multi-Sanostol, syrop, 600 g

Substancjami czynnymi leku są: witamina A, witamina D3, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina C, witamina E, witamina PP, dekspantenol, wapnia glukonian, wapnia fosforomleczan.

10 ml zawiera:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Witamina A - retynolu palmitynian | 2400 j.m. |
| Witamina D3 - cholekalcyferol | 200 j.m. |
| Witamina B1- tiaminy chlorowodorek | 2 mg |

| | |
|--|--------|
| Witamina B2 - ryboflawiny sodu fosforan | 2 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyny chlorowodorek | 1 mg |
| Witamina C - kwas askorbowy | 100 mg |
| Witamina E - all-rac-alfa-tokoferolu octan | 2 mg |
| Witamina PP - nikotynamid | 10 mg |
| Deksapantenol | 4 mg |
| Wapnia glukonian | 50 mg |
| Wapnia fosforomleczan | 50 mg |

Pozostałe składniki to: sacharoza, syrop glukozowy, kwas cytrynowy bezwodny, agar, tragakanta, ekstrakt słodowy, olejek pomarańczowy, koncentrat soku grejpfrutowego, koncentrat soku pomarańczowego, sodu benzoesan, kwas sorbowy, wapnia sacharynian czterowodny, polisorbata 80, olej słonecznikowy, all-rac- α -tokoferol, woda oczyszczona.

Działanie Multi-Sanostol, syrop, 600 g

Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Codzienna dieta jest często zbyt uboga i nie jest w stanie pokryć dziennego zapotrzebowania na witaminy.

Wskazania Multi-Sanostol, syrop, 600 g

Lek Multi-Sanostol stosowany jest:

- w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy;
- w utracie apetytu;
- w skłonnościach do częstych infekcji;
- w okresie wzrostu i rozwoju;
- w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczeniu;
- w obniżonej zdolności koncentracji;
- w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii;
- w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Lek Multi-Sanostol może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym.

Dawkowanie Multi-Sanostol, syrop, 600 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Dzieci w wieku 1 do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml syropu.

Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.

Przeciwwskazania Multi-Sanostol, syrop, 600 g

Kiedy nie stosować leku Multi-Sanostol:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
jeśli u pacjenta występują rzadkie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy;
jeśli u pacjenta występują zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria);
jeśli u pacjenta występują zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D).

Informacje dodatkowe Multi-Sanostol, syrop, 600 g

Lek Multi-Sanostol zawiera: sacharozę, syrop glukozowy, sodu benzoesan, kwas sorbowy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
10 ml leku Multi-Sanostol zawiera 6,55 g sacharozy i 1,31 g glukozy, co jest równoważne około 0,66 jednostki węglowodanowej. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C