

Mycospor (Canespor) 10 mg/g (1%) krem, 15 g

Cena: 82,69 zł



Opis słownikowy

Postać	krem
Producent	Bayer
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Bifonazol

Opis produktu

Informacje podstawowe Mycospor (Canespor) 10 mg/g (1%) krem, 15 g

Mycospor w postaci kremu jest lekiem przeciwgrzybiczym, zawierającym substancję czynną bifonazol.

Skład Mycospor (Canespor) 10 mg/g (1%) krem, 15 g

Substancją czynną leku Mycospor jest bifonazol.

Pozostałe składniki to: alkohol benzylovowy, alkohol cetylostearylowy, cetylu palmitynian, polisorbata 60, oktylododekanol, woda oczyszczona, sorbitanu stearynian.

Działanie Mycospor (Canespor) 10 mg/g (1%) krem, 15 g

Mycospor ma szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego. Jest skuteczny wobec dermatofytów oraz drożdży. Hamuje syntezę ergosterolu - enzymu niezbędnego w namnażaniu się mikroorganizmów. Bifonazol łagodzi ponadto świąd, charakterystyczny w zakażeniach grzybiczych. Preparat łatwo penetruje do skóry właściwej

Wskazania Mycospor (Canespor) 10 mg/g (1%) krem, 15 g

Lek Mycospor jest wskazany w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, takich jak: grzybica dłoni i stóp, grzybica tułowia, grzybica fałdów skórnych, łupież pstry, grzybice powierzchniowe skóry oraz w miejscowym leczeniu łupieżu rumieniowatego

Dawkowanie Mycospor (Canespor) 10 mg/g (1%) krem,15 g

Lek należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem, przed snem. Niewielka ilość leku jest zazwyczaj wystarczająca do pokrycia skóry ze zmianami chorobowymi wielkości dłoni.

Sposób stosowania

Należy nanieść cienką warstwę leku na obszar objęty zmianami chorobowymi i delikatnie wmasować.

Czas leczenia lekiem ustala lekarz.

Przeciwwskazania Mycospor (Canespor) 10 mg/g (1%) krem,15 g

Uczulenie na substancję czynną - bifonazol - lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Informacje dodatkowe Mycospor (Canespor) 10 mg/g (1%) krem,15 g

Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne przeciwgrzybicze pochodne imidazolu (np. ekonazol, klotrymazol, mikonazol), powinni ostrożnie stosować leki zawierające bifonazol.

Jeżeli objawy choroby utrzymują się lub nie ustępują po przerwaniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy unikać kontaktu leku Mycospor z oczami. Nie połykać.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować leku Mycospor w pierwszym trymestrze ciąży.

Jeśli lekarz zdecyduje o konieczności zastosowaniu leku Mycospor w okresie karmienia piersią, należy przerwać karmienie piersią.

Interakcje z innymi lekami

Stosowanie leku Mycospor z warfaryną, zwiększa ryzyko wystąpienia krwotoku. W przypadku jednoczesnego stosowania leku Canespor i warfaryny, pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Mycospor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

ból w miejscu podania, obrzęk obrzeżny (w miejscu podania), kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry, rumień, świąd, wysypka, pokrzywka, pęcherzyki, łuszczenie skóry, wyprysk, suchość skóry, podrażnienie skóry, maceracja skóry, uczucie pieczenia na skórze.