

Nasometin Control, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 120 dawek



Cena: 24,11 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------|
| Postać | aerozol |
| Producent | Sandoz |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Mometazon |

Opis produktu

Informacje podstawowe Nasometin Control, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 120 dawek

Nasometin Control to lek w formie aerozolu do nosa, który stosuje się w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, czyli kataru siennego, objawiającego się świądem nosa oraz kichaniem. Lek zawiera miejscowo działający przeciwzapalny furoinian mometazonu, który należy do kortykosteroidów.

Skład Nasometin Control, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 120 dawek

Substancją? czynną? leku jest mometazonu furoinian (*Mometasoni furoas*).

1 rozpylona dawka leku zawiera 50 µg mometazonu furoinianu w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego. Całkowita masa zawiesiny rozpylanej w 1 dawce wynosi 100 mg.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, glicerol, kwas

cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwa?

Działanie Nasometin Control, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 120 dawek

Nasometin Control zawiera mometazonu furoinian o miejscowym działaniu przeciwzapalnym z grupy kortykosteroidów. Lek powoduje zmniejszenie obrzęku oraz podrażnienia błony śluzowej nosa, przez co łagodzi kichanie, świąd a także niedrożność czy wyciek z nosa wywołane przez katar sienny.

Wskazania Nasometin Control, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 120 dawek

Nasometin Control stosuje się przy leczeniu objawów zdiagnozowanego sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, inaczej nazywanego katarzem siennym, który objawia się obrzękiem oraz podrażnieniem błony śluzowej nosa, kichaniem, wyciekami z nosa.

Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Dawkowanie Nasometin Control, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 120 dawek

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się do otworów nosowych.

W przypadku niektórych pacjentów poprawa występuje już po 12 godzinach od podania pierwszej dawki, ale pełny efekt działania może być widoczny dopiero po dwóch dniach stosowania aerozolu.

Jeśli po 14 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować aerozolu Nasometin Control dłużej niż 1 miesiąc bez konsultacji z lekarzem.

Dorośli powyżej 18 lat: 2 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Po uzyskaniu poprawy dawkowanie można zmniejszyć do 1 rozpylenia do każdego otworu nosowego dziennie, a jeśli objawy nasiliłyby się to można wrócić do dwóch rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Przeciwwskazania Nasometin Control, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 120 dawek

Kiedy nie stosować leku Nasometin Control:

jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian albo którykolwiek z pozostałych składników leku,
u pacjentów z nieleczonym zakażeniem błony śluzowej nosa, stosowanie leku w czasie infekcji nosa (np. podczas występowania opryszczki) może pogorszyć przebieg choroby - aerozol stosować po ustąpieniu zakażenia,
u osób, które niedawno przeżyły zabieg chirurgiczny w obrębie nosa albo doznały urazu nosa - nie stosować leku aż rany w nosie zagoją się.

Informacje dodatkowe Nasometin Control, 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 120 dawek

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:

choruje lub chorował w przeszłości na gruźlicę;
ma jakiegokolwiek inne zakażenie;
otrzymuje inne kortykosteroidy (doustnie lub w zastrzykach);
choruje na mukowiscydozę.

Podczas stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (pacjent ma trudności ze zwalczeniem zakażenia), a pacjent ma kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną. Należy unikać kontaktu z takimi osobami;

pacjent ma zakażenie w obrębie nosa lub gardła;

pacjent stosuje lek przez miesiąc bez konsultacji z lekarzem;

pacjent ma utrzymujące się podrażnienie nosa lub gardła,

wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidów w aerozolu do nosa może spowodować wystąpienie działań niepożądanych na skutek wchłaniania się leku do organizmu.

Nasometin Control zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa, zwłaszcza jeśli lek stosowany jest przez długi czas.

Przed zastosowaniem pierwszej dawki należy mocno wstrząsnąć butelką i rozpylić lek 10-krotnie (aż do uzyskania jednorodnego aerozolu). Jeśli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, należy sprawdzić jej działanie przed kolejnym użyciem przez dwukrotne rozpylenie leku, do uzyskania jednorodnego aerozolu.

Przechowywanie:

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 2 miesiące. Nie odkręcać pompki ani dozownika.

Nie zamrażać.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.