

# Neo-Pancreatinum forte, 10000 j. kapsułki dojelitowe, 20 szt.

Cena: 23,69 zł



## Opis słownikowy

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Postać            | kapsułki        |
| Producent         | Pharmaswiss     |
| Rejestracja       | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Pancreatinum    |

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Neo-Pancreatinum forte, 10000 j. kapsułki dojelitowe, 20 szt.

Neo-Pancreatinum forte to lek w postaci kapsułek dojelitowych zawierających pankreatynę, ułatwiającą trawienie białek, cukrów i tłuszczów. Każda kapsułka zawiera peletki odporne na działanie kwasu żołądkowego, dzięki czemu pankreatyna uwalnia się po opuszczeniu żołądka.

### Skład Neo-Pancreatinum forte, 10000 j. kapsułki dojelitowe, 20 szt.

Substancją czynną leku jest pankreatyna (Pancreatinum)

1 kapsułka zawiera pankreatynę o aktywności: lipazy 10000 j. Ph. Eur., amylazy 8000 j. Ph. Eur., proteaz 500 j. Ph. Eur.

Substancje pomocnicze: peletka: kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1), trietylu cytrynian, talk, symetykon; otoczka kapsułki część zewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172) otoczka kapsułki część wewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), lak aluminowy żółcieni chinolinowej (E 104).

### Działanie Neo-Pancreatinum forte, 10000 j. kapsułki dojelitowe, 20 szt.

Neo-Pancreatinum Forte należy do grupy leków zwanych "terapią zastępczą enzymami trzustkowymi". Każda kapsułka zawiera 3

rodzaje enzymów: proteazę, amylazę i lipazę. Pomagają przetworzyć i strawić jedzenie.

## Wskazania Neo-Pancreatinum forte, 10000 j. kapsułki dojelitowe, 20 szt.

Produkt Neo-Pancreatinum Forte stosowany jest w stanach niedoboru enzymów trzustkowych o różnej etiologii, jak:

- przewlekłe zapalenie trzustki,
- mukowiscydoza,
- niedrożność przewodów żółciowych lub trzustkowych przez nowotwór,
- operacja usunięcia trzustki lub żołądka.

## Dawkowanie Neo-Pancreatinum forte, 10000 j. kapsułki dojelitowe, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki leku dobiera się indywidualnie w zależności od stopnia niewydolności trzustki pacjenta. Zwykle stosowane dawki:

Dorośli: doustnie, od 2 do 4 kapsułek do każdego posiłku.

Dzieci: doustnie, 500 – 1000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc./posiłek, np. dzieci o masie ciała 15 kg: od  $\frac{3}{4}$  do 1,5 zawartości kapsułki.

- Ustaloną dawkę można zwiększyć zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Produkt należy przyjmować w czasie posiłku, popijając płynem.
- Kapsułki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać, kruszyć ani trzymać w jamie ustnej, gdyż może to powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, a także zmniejszyć skuteczność działania produktu.
- W przypadku trudności połykania całych kapsułek (szczególnie u małych dzieci), można wysypać peletki z kapsułki, wymieszać z niewielką ilością pokarmu o pH mniejszym niż 5,5 i bez żucia natychmiast połknąć, a następnie popić szklanką wody lub soku.

## Przeciwwskazania Neo-Pancreatinum forte, 10000 j. kapsułki dojelitowe, 20 szt.

Kiedy nie stosować leku Neo-Pancreatinum Forte:

- w razie nadwrażliwości na pankreatynę, inne składniki preparatu, białko wieprzowe,
- w ostrym zapaleniu trzustki,
- w pogarszaniu przewlekłego zapalenie trzustki.

## Informacje dodatkowe Neo-Pancreatinum forte, 10000 j. kapsułki dojelitowe, 20 szt.

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

#### Zaburzenia układu immunologicznego:

- wysypka, kichanie, łzawienie.

#### Zaburzenia żołądka i jelit:

- biegunka, nudności, wymioty.

#### Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

- zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy (przy stosowaniu dużych dawek).

### Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

- lek hamuje wchłanianie kwasu foliowego i żelaza.

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Należy zachować ostrożność jeśli lek podawany jest dzieciom z mukowiscydozą przyjmującym duże dawki enzymów, ponieważ w rzadkich przypadkach - zanotowano u tych dzieci zwężenie jelita.

### **Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Neo-Pancreatinum Forte może wchodzić w interakcje z:

- lekami stosowanymi na zgagę i nadkwaśność (np. cymetydyna, ranitydyna, famotydyna),
- kwasem foliowym i solami żelaza (również obecnymi w pożywieniu).

### **Stosowanie leku z jedzeniem i pićm**

Lek Neo-Pancreatinum Forte należy przyjmować z posiłkiem i dużą ilością płynów.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży**

Stosowanie u dzieci wyłącznie po konsultacji z lekarzem.