

Neospasmina, syrop, 119 ml (150 g) Herbapol Lublin



Cena: 14,29 zł

Opis słownikowy

Marka	Herbapol
Postać	syrop
Producent	Polpharma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Etanol, Głóg, Kozłek

Opis produktu

Informacje podstawowe Neospasmina, syrop, 119 ml (150 g) Herbapol Lublin

Neospasmina - produkt leczniczy roślinny uspokajający i ułatwiający zasypianie.

Skład Neospasmina, syrop, 119 ml (150 g) Herbapol Lublin

Substancja czynna leku jest wyciąg płynny złożony z *Crataegus monogyna* Jacq. (Lindm.), *Crataegus laevigata* (Poir.) D.C fructus (owoce głogu)/ *Valeriana officinalis* L., radix (korzeń kozłka).

100 g syropu zawiera 18 g wyciągu płynnego złożonego (1:1) z *Crataegus monogyna* Jacq. (Lindm.), *Crataegus laevigata* (Poir.) D.C fructus (owoce głogu)/ *Valeriana officinalis* L., radix (korzeń kozłka) (1/1)

Ekstrahent: etanol 50%

Substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan (E211), esencja pomarańczowa, woda oczyszczona.

Zawartość etanolu w produkcie nie więcej niż 10%.

Działanie Neospasmina, syrop, 119 ml (150 g) Herbapol Lublin

Lek wykazuje łagodne działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie.

Wskazania Neospasmina, syrop, 119 ml (150 g) Herbapol Lublin

Neospasmina stosuje się pomocniczo w leczeniu zaburzeń nerwowych takich jak łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju oraz trudności z zasypianiem.

Dawkowanie Neospasmina, syrop, 119 ml (150 g) Herbapol Lublin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek Neospasmina jest przeznaczony do leczenia objawowego.

Dorośli:

- pomocniczo w leczeniu zaburzeń nerwowych takich jak łagodne stany napięcia i uczucia niepokoju: dawka jednorazowa 10 ml syropu stosować 2 do 3 razy na dobę.
- pomocniczo w leczeniu trudności z zasypianiem dawka jednorazowa 15 ml syropu od pół do godziny przed snem.

Maksymalna dawka dobową: 4 jednorazowe dawki (40 ml).

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania Neospasmina, syrop, 119 ml (150 g) Herbapol Lublin

Kiedy nie stosować leku Neospasmina:

- jeśli pacjent ma uczulenie na owoc głogu lub korzeń kozłka, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Informacje dodatkowe Neospasmina, syrop, 119 ml (150 g) Herbapol Lublin

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną:

- nudności,
- skurcze brzucha.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować u pacjentów z uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi.
- Lek zawiera 10% etanol tzn. do 790 mg na dawkę, co jest równoważne 20 ml piwa, 8,4 ml wina na dawkę syropu.
- Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.
- Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
- 15 ml syropu zawiera 9,9 g sacharozy, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjen powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25oC.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie z syntetycznymi środkami uspakajającymi nie jest zalecane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na zawartość etanolu leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak danych.

U dzieci od 6 do 12 lat i młodzieży, lek należy stosować pod kontrolą lekarza. Ze względu na zawartość alkoholu leku nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Pacjenci stosujący lek nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek zawiera do 10% etanolu.

Dawka jednorazowa 10 ml zawiera 790 mg alkoholu.